

Tillstånd och upplysning

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för **Steward 30 WG**

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytoxicitetstestningar; användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring <sup>3)</sup>
							Produkt	Verksamt ämne		
Hallon, krusbär, björnbär, blåbär, vita och röda vinbär på friland	Mot insekts- angrepp	Fläktspruta Bomspruta		1		7	170 g/ha	51 g/ha		
Körbär och plommon	Mot insekts- angrepp	Fläktspruta	Före blomning och/eller BBCH 69-72	2	21	7	230 g/ha	70 g/ha	Totala maximala dosen får inte överstiga 340 g produkt/ha och säsong.	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
Åtgärder för skydd av bin och pollinerande insekter.	Växtskyddsmedlet får inte spridas där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. Avlägsna eller täck över bikupor som är placerade i fältet tills sprutvätskan har torkat in. Om bikupor utanför fältet kan exponeras vid sprutning ska det anpassade skyddsavståndet bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd lantbrukspruta med bom" eller "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling"		

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]