

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Tombo**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och information	Ändring <sup>3)</sup>
							Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete, höstråg och höstrågvete	Mot ogräs	Bomspruta	21-32	1			200 g/ha	10 g pyroxsulam/ha 10 g aminopyralid <sup>4)</sup> /ha 5 g florasulam/ha		
Vårvete	Mot ogräs	Bomspruta	21-32	1			150 g/ha	7,5 g pyroxsulam/ha 7,5 g aminopyralid <sup>4)</sup> /ha 3,75 g florasulam/ha		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
Vindanpassade skyddsavstånd	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom"	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	X
Skydd av efterföljande gröda vid omsådd	Efter behandling med produkten får omsådd endast göras av stråsäd, majs och gräs. Omsådden får göras tidigast 6 veckor efter plöjning eller annan djupbearbetning.	Produkten innehåller aminopyralid som kan skada efterföljande grödor.	

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

<sup>4</sup> Dosen avser syraformen av aminopyralid kaliumsalt

Datum  
2017-09-21Diariernr  
5.1.1-B17-00269Aktnr  
F-4255

## Tillstånd och upplysning

Produktnamn  
Tombo

Produktkod

Reg nr  
5267

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
Skydd av efterföljande grödor	Halm från en behandlad gröda och gödsel (ej flytgödsel) som innehåller behandlad halm ska inarbetas (nedplöjas) i jorden före etablering - minst fyra månader vid doser upp till och med 100 g produkt/ha - minst sju månader vid doser över 100 g produkt/ha Detta gäller alla grödor utom stråsåd, majs, gräs samt raps och rybs  Etablering av följande grödor efter behandling med produkten får ske tidigast: - <b>14 månader:</b> potatis och andra solanumarter, sockerbetor, morötter, lök och andra flockblommiga växter. - <b>24 månader:</b> bönor, ärtor och andra baljväxter, gurka, sallat och andra grödor ur gruppen huvudsallater.	Produkten innehåller aminopyralid som kan skada efterföljande grödor.	
Hantering av halm och gödsel	Halm från en behandlad gröda får användas som foder eller strö i det egna jordbruket. Halm från en behandlad gröda och gödsel (ej flytgödsel) som innehåller behandlad halm får endast bortföras från det egna jordbruket till förbränning eller industriellt bruk. Behandlad halm får inte användas i växthus, svampproduktion, kompost, biogasanläggning eller som täckmantel (frostskydd) för tvåhjärtbladiga växter.	Produkten innehåller aminopyralid som kan finnas kvar i halm från behandlad gröda.	
Vid beredning av sprutvätska	Vid beredning av sprutvätska ska tillsatsmedlet PG26N tillsättas.	Villkoret är till för att produkten ska vara effektiv.	