

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Starane XL**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

| Gröda/område/situation | Syfte | Behandlings- utrustning/ metod | Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max) | Max antal behand- lingar | Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn) | Karens- tid (dygn) ² | Max dos vid varje behandling | | Övriga villkor och förtydliganden | Ändring ³ |
|--|-----------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|---|---|----------------------|
| | | | | | | | Produkt | Verksamt ämne | | |
| Höstvete, höstkorn, höstråg och höstrågvete | Mot örtogräs | Bomspruta | 20-29 Endast vår- behandling | 1 | | | 1 L/ha | 100 g/ha fluroxipyr ⁴ 2,5 g/ha florasulam | Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. | |
| Höstvete, höstkorn, råg och rågvete | Mot örtogräs | Bomspruta | 30-45 Endast vår- behandling | 1 | | | 1,2 L/ha | 120 g/ha fluroxipyr ⁴ 3,0 g/ha florasulam | Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. | |
| Vårvete, vårkorn och havre | Mot örtogräs | Bomspruta | 13-19 | 1 | | | 0,36 L/ha | 36 g/ha fluroxipyr ⁴ 0,9 g/ha florasulam | Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. | |
| Vårvete, vårkorn och havre | Mot örtogräs | Bomspruta | 20-29 | 1 | | | 0,8 L/ha | 80 g/ ha fluroxipyr ⁴ 2,0 g/ha florasulam | Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras | |

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

⁴ Beräknat från mängden fluroxipyr-meptyl

Datum
2017-10-27Diariernr
5.1.1-B17-00273Aktnr
F-2352

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Starane XLReg nr
4686

| Gröda/område/situation | Syfte | Behandlings- utrustning/ metod | Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max) | Max antal behand- lingar | Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn) | Karens- tid (dygn) ² | Max dos vid varje behandling | | Övriga villkor och förtydliganden | Ändring ³ |
|--|--------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|--|--|----------------------|
| | | | | | | | Produkt | Verksamt ämne | | |
| Vårvede, vårkorn och havre | Mot örtogräs | Bomspruta | 30-45 | 1 | | | 1,0 L/ha | 100 g/ha fluroxipyr ⁴ 2,5 g/ha florasulam | Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. | |
| Nyetabletering av slättervall, betesvall och gräsfrö till utsäde | Mot örtogräs | Bomspruta | 20-45 Endast vår- behandling | 1 | | 7 | 1,5 L/ha | 150 g/ha fluroxipyr ⁴ 3,75 g/ha florasulam | Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. | |
| Etablerad slättervall, betesvall och gräsfrö till utsäde | Mot örtogräs | Bomspruta | 20-45 Endast vår- behandling | 1 | | 7 | 1,8 L/ha | 180 g/ha fluroxipyr ⁴ 4,5 g/ha florasulam | Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras | |

Ytterligare villkor

| Kategori | Villkor | Anmärkning | Ändring ³ |
|----------------------------|---|--|----------------------|
| Släpp av betesdjur | Betesdjur får inte släppas på behandlad mark tidigare än 7 dagar efter behandling. | | |
| Personlig skyddsutrustning | Skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska. | Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd | X |