

Tillstånd och upplysning

## Villkor för användning av **Raptol Insekt Effekt Färdigblandad**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

| Gröda/område/situation                                                                                                                                                | Syfte                      | Behandlings-<br>utrustning/<br>metod | Utvecklings-<br>stadium <sup>1)</sup><br>/säsong<br>(min-max) | Max<br>antal<br>behand-<br>lingar/år | Behandlings-<br>intervall<br>(dygn) | Karens-<br>tid<br>(dygn) <sup>2)</sup> | Max dos vid varje behandling |                                                                      |                                                           | Ändring <sup>3)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                       |                            |                                      |                                                               |                                      |                                     |                                        | Produkt                      | Verksamt ämne                                                        |                                                           |                       |
| Äpple, päron                                                                                                                                                          | Mot<br>insekts-<br>angrepp | Sprutning                            |                                                               | 2                                    | Minst 7                             | 3                                      | 150 mL/m <sup>2</sup>        | 7,50 mg/m <sup>2</sup> pyretriner<br>1238 mg/m <sup>2</sup> rapsolja | Bladens över- och<br>undersida sprutas till<br>avrinning. | X                     |
| Körsbär, plommon                                                                                                                                                      | Mot<br>insekts-<br>angrepp | Sprutning                            |                                                               | 2                                    | Minst 7                             | 3                                      | 122,5 mL/m <sup>2</sup>      | 6,13 mg/m <sup>2</sup> pyretriner<br>1011 mg/m <sup>2</sup> rapsolja | Bladens över- och<br>undersida sprutas till<br>avrinning. | X                     |
| Vinbär, krusbär, blåbär                                                                                                                                               | Mot<br>insekts-<br>angrepp | Sprutning                            |                                                               | 2                                    | Minst 7                             | 3                                      | 100 mL/m <sup>2</sup>        | 5 mg/m <sup>2</sup> pyretriner<br>825 mg/m <sup>2</sup> rapsolja     | Bladens över- och<br>undersida sprutas till<br>avrinning. | X                     |
| Frilandsodling av sallat,<br>spenat, portlak, persilja,<br>örter, morot, rödbeta,<br>rotpersilja, palsternacka,<br>rädisa, svartrot, cikoria,<br>kålrot och pepparrot | Mot<br>insekts-<br>angrepp | Sprutning                            |                                                               | 2                                    | 5-7                                 | 3                                      | 60 mL/m <sup>2</sup>         | 3 mg/m <sup>2</sup> pyretriner<br>495 mg/m <sup>2</sup> rapsolja     | Bladens över- och<br>undersida sprutas till<br>avrinning. | X                     |
| Växthusodling av sallat,<br>spenat, portlak, persilja<br>och örter                                                                                                    | Mot<br>insekts-<br>angrepp | Sprutning                            |                                                               | 2                                    | 5-7                                 | 7                                      | 60 mL/m <sup>2</sup>         | 3 mg/m <sup>2</sup> pyretriner<br>495 mg/m <sup>2</sup> rapsolja     | Bladens över- och<br>undersida sprutas till<br>avrinning. | X                     |

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

## BESLUTSBILAGA 3

Datum  
2017-08-30Diariernr  
06.1.1-B13-00332Aktnr  
F-2199

Tillstånd och upplysning

Produktnamn  
Raptol Insekt Effekt  
Färdigblandad

Produktkod

Reg nr  
5350

| Gröda/område/situation              | Syfte                      | Behandlings-<br>utrustning/<br>metod | Utvecklings-<br>stadium <sup>1)</sup><br>/säsong<br>(min-max) | Max<br>antal<br>behand-<br>lingar/år | Behandlings-<br>intervall<br>(dygn) | Karens-<br>tid<br>(dygn) <sup>2)</sup> | Max dos vid varje behandling |                                                                  |                                                           | Ändring <sup>3)</sup> |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                     |                            |                                      |                                                               |                                      |                                     |                                        | Produkt                      | Verksamt ämne                                                    |                                                           |                       |
| Tomat och aubergine                 | Mot<br>insekts-<br>angrepp | Sprutning                            |                                                               | 2                                    | 5-7                                 | 3                                      | 120 mL/m <sup>2</sup>        | 6 mg/m <sup>2</sup> pyretriner<br>990 mg/m <sup>2</sup> rapsolja | Bladens över- och<br>undersida sprutas till<br>avrinning. | X                     |
| Frilandsodling av<br>prydnadsväxter | Mot<br>insekts-<br>angrepp | Sprutning                            | Växter<br>under 50<br>cm                                      | 2                                    | Minst 7                             |                                        | 60 mL/m <sup>2</sup>         | 3 mg/m <sup>2</sup> pyretriner<br>495 mg/m <sup>2</sup> rapsolja | Bladens över- och<br>undersida sprutas till<br>avrinning. | X                     |
| Frilandsodling av<br>prydnadsväxter | Mot<br>insekts-<br>angrepp | Sprutning                            | Växter över<br>50 cm                                          | 2                                    | Minst 7                             |                                        | 120 mL/m <sup>2</sup>        | 6 mg/m <sup>2</sup> pyretriner<br>990 mg/m <sup>2</sup> rapsolja | Bladens över- och<br>undersida sprutas till<br>avrinning. | X                     |
| Växthusodling av<br>prydnadsväxter  | Mot<br>insekts-<br>angrepp | Sprutning                            |                                                               | 4                                    | Minst 7                             |                                        | 120 mL/m <sup>2</sup>        | 6 mg/m <sup>2</sup> pyretriner<br>990 mg/m <sup>2</sup> rapsolja | Bladens över- och<br>undersida sprutas till<br>avrinning. | X                     |

## Ytterligare villkor

|                                                                 | Villkor                                                                                                                                                                                                                                                                          | Anmärkning                                                       | Ändring <sup>3)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Åtgärder för skydd av<br>miljö                                  | Den som sprider växtskyddsmedlet utomhus ska hålla följande minsta skyddsavstånd:<br>- 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar,<br>- 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant. | Villkoret är till för att<br>skydda vattenlevande<br>organismer. | X                     |
| Åtgärder för skydd av<br>bin och andra<br>pollinerande insekter | Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter<br>föda.                                                                                                                                                                      | Spridning av produkten<br>bör göras nattetid.                    | X                     |
| Utformning av<br>växthus                                        | Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte<br>uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.                                                                                                         | Omfattar inte<br>tunnelodling.                                   | X                     |
| Utformning av<br>tunnelodling                                   | Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och<br>där delar av täckmaterialet kan rullas upp.                                                                                                                                  | Omfattar inte växthus.                                           | X                     |