

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Gallery**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Frilandsodling av jordgubbar	Mot ogräs	Bandspruta	10-41 Utveckling av första bladet till första synliga stolon	1			125 mL/ha	62,5 g/ha isoxaben	Högst 50 % av odlingsytan får behandlas. Vilket innebär att den yta som behandlas, behandlas med 250 mL produkt/ha.	X
Frilandsodling av vinbär, hallon och krusbär	Mot ogräs	Bandspruta	00-09 Vårbehandling, fram till bladsprickning	1		100	75 mL/ha	37,5 g/ha isoxaben	Högst 30 % av odlingsytan får behandlas. Vilket innebär att den yta som behandlas, behandlas med 250 mL produkt/ha.	X
Frilandsodling av plantskoleväxter	Mot ogräs	Bandspruta	När grödan har ett etablerat rotsystem	1			75 mL/ha	37,5 g/ha isoxaben	Högst 30 % av odlingsytan får behandlas. Vilket innebär att den yta som behandlas, behandlas med 250 mL produkt/ha.	X

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2017-12-12Diariernr
06.1.1-B13-00200Aktnr
F-3732

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
GalleryReg nr
5389

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Vindanpassade skyddsavstånd vid användning av bandspruta	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	X