

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Pixxaro EC**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2</sup>	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring <sup>3</sup>
							Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete, höstkorn, höstråg och höstrågvete	Mot örtogräs	Bomspruta	23-45 Endast vårbehandling				500 mL/ha	6 g/ha halauxifen-metyl 140 g/ha fluroxipyr <sup>4</sup>		
Vårvete och vårkorn	Mot örtogräs	Bomspruta	13-45				350 mL/ha	4,4 g/ha halauxifen-metyl 98 g/ha fluroxipyr <sup>4</sup>		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3</sup>
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar och skyddsglasögon ska användas vid hantering av produkten.  Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	X
Vindanpassade skyddsavstånd	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom."	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och växter utanför fältet	X

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

<sup>4</sup> Beräknat från mängden Fluroxipyr-1-metylheptylester som ingår i produkten