

Tillstånd och upplysning

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för **Nissorun SC**

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytoxicitetstestningar; användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne		
Växthusodling av prydnadsväxter och plantskoleväxter	Mot angrepp av spinnkvalster	Sprutning		2	7		30 µL/m ²	7,5 mg/m ²	Antal behandlingar gäller per odlingskultur. Vid spridning av produkten ska 100-150 mL vatten per m ² användas	
Tunnel- och frilandsodling av prydnadsväxter och plantskoleväxter	Mot angrepp av spinnkvalster	Sprutning	Maj-september	2	30		0,30 L/ha	75 g/ha	Antal behandlingar gäller per fält och år. Vid spridning av produkten ska 1000-1500 L vatten per hektar användas	
Växthusodling av jordgubbar	Mot angrepp av spinnkvalster	Sprutning		1		3	24 µL/m ²	6 mg/m ²	Antal behandlingar gäller per år. Vid spridning av produkten ska minst 40 mL vatten per m ² användas.	
Tunnelodling av jordgubbar	Mot angrepp av spinnkvalster	Sprutning	Upp till 97	1		3	0,24 L/ha	60 g/ha	Antal behandlingar gäller per år. Vid spridning av produkten ska minst 400 L vatten per hektar användas.	

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2018-04-16

5.1.1-B17-00616

Aktnr
F-4434Produktnamn
Nissorun SC

Produktkod

Reg nr
5334

Tillstånd och upplysning

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne		
Växthusodling av tomat och aubergine	Mot angrepp av spinn- kvalster	Sprutning		1		3	30 µL/m ²	7,5 mg/m ²	Antal behandlingar gäller per odlingskultur. Vid spridning av produkten ska 80-160 mL vatten per m ² användas	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Personlig skydds- utrustning	Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten och vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma. Vid arbete med behandlade prydnadsväxter ska skyddshandskar och arbetskläder användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Vid återinträde i behandlade utrymmen	Återinträde i lokaler där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandlingen.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Anpassade skyddsavstånd vid användning av bomspruta eller fläktspruta	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling" eller "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	
Tillredning av sprutvätska	Produkten ska skakas före användning.	Villkoret är till för att produkten ska vara homogen vid tillredning av sprutvätska.	
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling.	
Utformning av tunnel	Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp	Omfattar inte växthus.	