

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **RATIO Super SX**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Vårvete, vårkorn och havre	Mot örtogräs	Bomspruta	11-39	1 gång/år			30g/ha	7,2 g /ha tribenuron ⁴ 7,2 g/ha tifensulfuron ⁵	Användning får även ske i stråsäd med insädd av vall.	X
Höstvete, höstkorn, höstråg och rågvete	Mot örtogräs	Bomspruta	20-39 Endast vår- behandling	1 gång/år			30g/ha	7,2 g /ha tribenuron ⁴ 7,2 g/ha tifensulfuron ⁵	Användning får även ske i stråsäd med insädd av vall.	X

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Vindanpassade skyddsavstånd	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	X
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	X

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

⁴ Dosen motsvarar 7,5 g/ha tribenuronmetyl

⁵ Dosen motsvarar 7,5 g /ha tifensulfuronmetyl