

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Steward 30 WG**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2</sup>	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring <sup>3</sup>
							Produkt	Verksamt ämne		
Raps och rybs	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	40-57	1 gång/år			85 g/ha	25,5 g/ha		
Äpple och päron	Mot insekts- angrepp	Fläktspruta		2 gångar/år	21	7	230 g/ha	70 g/ha	Totala maximala dosen får inte överstiga 340 g produkt/ha och säsong.	
Broccoli, blomkål, vitkål, rödkål och savoykål	Mot insekts- angrepp	Sprutning	>40	3 gångar/år	8	1	85 g/ha	25,5 g/ha	Totala maximala dosen får inte överstiga 255 g produkt/ha och säsong.	X
Brysselkål	Mot insekts- angrepp	Sprutning	>40	3 gångar/år	8	28	85 g/ha	25,5 g/ha	Totala maximala dosen får inte överstiga 255 g produkt/ha och säsong.	X
Gurka, zucchini, pumpa, tomat, paprika, chili, aubergin och melon i växthus	Mot insekts- angrepp	Sprutning		3 gångar/år	8	1	12,5 g/ha	3,75 g/ha	Maximalt 6 behandlingar per växthus och år får göras.	X

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum  
2018-04-26Diariernr  
5.1.1-B17-00683Aktnr  
F-3431

Tillstånd och upplysning

Produktnamn  
Steward 30 WGReg nr  
5429

## Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3</sup>
Åtgärder för skydd av bin och andra pollinerande insekter.	Växtskyddsmedlet får inte spridas där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. Avlägsna eller täck över bikupor som är placerade i fältet tills sprutvätskan har torkat in. Om bikupor utanför fältet kan exponeras vid spridning ska ett vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälprea vid bestämning av anpassade skyddsavstånd".		X
Åtgärder för skydd av pollinerande insekter i växthus	Ta bort humlekolonier och andra pollinerande insekter eller stäng till ingången till boet innan spridning av växtskyddsmedlet. Insekterna får återintroduceras i odlingen 3 dagar efter behandlingen.		X
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling.	