

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Mustang Forte**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behand- ling (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2</sup>	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring <sup>3</sup>
							Produkt	Verksamt ämne		
Vårkorn, vårvete, vårhavre	Mot örtogräs	Bomspruta	13-20	1			300 mL/ha	3 g aminopyralid <sup>4</sup> /ha 1,5 g florasulam/ha 54 g 2,4-D <sup>5</sup> /ha	Endast en applicering per gröda och odlingssäsong.	
Vårkorn, vårvete, vårhavre	Mot örtogräs	Bomspruta	21-32	1			750 mL/ha	7,5 g aminopyralid <sup>4</sup> /ha 3,75 g florasulam/ha 135 g 2,4-D <sup>5</sup> /ha	Endast en applicering per gröda och odlingssäsong.	
Höstvete, höstråg, höstrågvete och höstkorn	Mot örtogräs	Bomspruta	21-32 Endast vårbehandling.	1			1 L/ha	10 g aminopyralid <sup>4</sup> /ha 5 g florasulam/ha 180 g 2,4-D <sup>5</sup> /ha		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3</sup>
Vindanpassade skyddsavstånd	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	
Personlig skydds- utrustning	Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätskan.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

<sup>4</sup> Dosen avser syraformen av aminopyralid tillsatt som aminopyralid kaliumsalt i produkten.

<sup>5</sup> Dosen avser syraformen av 2,4-D tillsatt som 2,4-D (etylhexylester) i produkten.

Datum  
2018-05-30

Diariernr  
5.1.1-B18-00098

Aktnr  
F-4273

## Tillstånd och upplysning

Produktnamn  
Mustang Forte

Reg nr  
5266

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3</sup>
Skydd av efterföljande gröda	<p>Stråsäd, raps, rybs, gräs och majs kan etableras den påföljande växtsäsongen.</p> <p>Mustang Forte innehåller aminopyralid som kan skada efterföljande känsliga grödor inom följande perioder efter behandling med Mustang Forte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>14 månader:</b> potatis och andra solanumarter, sockerbetor, morötter, lök och andra flockblommiga växter.</li> <li>- <b>24 månader:</b> bönor, ärtor och andra baljväxter, gurka, sallat och andra grödor ur gruppen huvudsallater.</li> </ul>		
Hantering av halm och gödsel	<p>Behandlad halm bör inte användas i växthus, svampproduktion eller som täckmantel (frostskydd) för tvåhjärtbladiga växter.</p> <p>Halm från en behandlad gröda och gödsel (ej flytgödsel) innehållande behandlad halm bör inarbetas (nedplöjas) i jorden minst sju månader före etablering av ovan angivna känsliga grödor. Inget särskilt tidsintervall för inarbetning i jorden behövs före sådd av stråsäd, raps, rybs, gräs och majs.</p> <p>Halm från en behandlad gröda kan användas som foder eller strö i det egna jordbruket. Halmen och gödsel (ej flytgödsel) som innehåller sådan halm får dock endast bortföras från det egna jordbruket till förbränning eller industriellt bruk.</p>		