Villkor för användning av **Caryx**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område /situation	Syfte	Behandlings-utrustning/ metod	Utvecklings-stadium[1] /säsong (min-max)	Max antal behand-lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens-tid (dygn)[2]	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring[3]
							Produkt	Verksamt ämne		
Höstraps	För tillväxt-reglering Mot *Leptospharia maculens*	Bomspruta	13-59	2 per år			1,4 L/ha	224 g/ha mepikvat[4] 42 g/ha metkonazol	Den totala maximala dosen får inte överstiga 1,4 L/ha och år. Om 2 behandlingar ska göras ska den ena behandlingen göras på hösten och den andra på våren.	
Vårraps	För tillväxt-reglering Mot *Leptospharia maculens*	Bomspruta	31-55	1 per år			1,4 l/ha	224 g/ha mepikvat[4] 42 g/ha metkonazol		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring[3]
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Skyddsutrustning	Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas.	Villkoret är till för att skydda ögonen.	

[1] BBCH
[2] Tid mellan sista behandling och skörd
[3] Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]
[4] Dosen avser mepikvat tillsatt som mepikvatklorid i produkten.

Mall-id: MAP-0033, 2017-07-11