

Tillstånd och upplysning

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för **Movento SC 100**

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetstestningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

Användning och syfte

Gröda/område/ situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Växthus- och tunnelodling av jordgubbar	Mot angrepp av insekter och kvalster	Sprutning	13-56 91-93	2 per år	14		10 mL/100 m ²	1 g spirotramat per 100 m ²	Vid spridning av produkten i växthus ska 40-200 ml vatten per m ² användas. Vid spridning av produkten i tunnel ska 3-5 L vatten per 100m ² användas.	
Frilandsodlingar av morot, rotselleri, rotpersilja, palsternacka, kålrot, rova och rödbeta	Mot insektsangrepp	Sprutning	12-49	3 per år	14	21	750 mL/ha	75 g spirotramat per ha	Vid spridning av produkten ska 200-500 L vatten per hektar användas.	
Tunnelodling av sallatsväxter och bladgrönsaker (även baby-leaf)	Mot insektsangrepp	Sprutning	12-49	2 per år	14	7	7,5 mL/100 m ²	750 mg spirotramat per 100m ²	Vid spridning av produkten i tunnel ska 2-5 L vatten per 100m ² användas	
Växthusodling av prydnadsväxter	Mot angrepp av insekter och kvalster	Sprutning	Före blomning	2 per år	14		75 µL/m ²	7,5 mg spirotramat per m ²	Vid spridning av produkten i växthus ska 50-100 ml vatten per m ² användas.	

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2018-07-04

Diariernr
5.1.1-B18-00054

Aktnr
F-3737

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Movento SC 100

Reg nr
5246

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Personlig skydds- utrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan samt vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas. Vid kontakt med behandlade växtdelar ska skyddshandskar användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Vid återinträde i behandlade utrymmen	Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandling. Vid återinträde i det behandlade utrymmet efter 24 timmar ska skyddsutrustning i form av skyddskläder och skyddshandskar användas. Återinträde får ske utan skyddsutrustning efter 48 timmar.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling.	
Utformning av tunnelodling	Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.	Omfattar inte växthus.	