

Tillstånd och upplysning

## Villkor för användning av **Flurostar 200**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium <sup>1</sup> / säsong (min-max)	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens-tid (dygn) <sup>2</sup>	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring <sup>3</sup>
							Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete och höstkorn	Mot örtogräs	Bomspruta	20-45 Endast vårbehandling	1 per år			1 L/ha	200 g/ha fluroxipyr <sup>4</sup>		X
Råg, rågvete, hösthavre och durumvete	Mot örtogräs	Bomspruta	20-45 Endast vårbehandling	1 per år			1 L/ha	200 g/ha fluroxipyr <sup>4</sup>		X
Vårvete och vårkorn	Mot örtogräs	Bomspruta	20-39	1 per år			0,75 L/ha	150 g/ha fluroxipyr <sup>4</sup>		X
Havre	Mot örtogräs	Bomspruta	20-31	1 per år			0,75 L/ha	150 g/ha fluroxipyr <sup>4</sup>		X
Fodermajs	Mot örtogräs	Bomspruta	13-16	1 per år			1 L/ha	200 g/ha fluroxipyr <sup>4</sup>		X
Nyetableerad odling av gräsfrö till utsäde, slåttervall och betesvall	Mot örtogräs	Bomspruta	t.o.m juli	1 per år		7	0,75 L/ha	150 g/ha fluroxipyr <sup>4</sup>		X
Etableerad odling av gräsfrö till utsäde, slåttervall och betesvall	Mot örtogräs	Bomspruta	t.o.m juli	1 per år		7	2 L/ha	400 g/ha fluroxipyr <sup>4</sup>		X

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

<sup>4</sup> Dosen avser fluroxipyr, tillsatt som fluroxipyr-1-metylheptylester i produkten.

## BESLUTSBILAGA 3

Datum  
2018-08-09Diariernr  
5.1.1-B18-00328Aktnr  
F-3419

Tillstånd och upplysning

Produktnamn  
Flurostar 200Reg nr  
5019

## Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3</sup>
Personlig Skyddsutrustning	Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	X
Gräsfrö till utsäde, slättervall och betesvall	Betesdjur får inte släppas på bete tidigare än 7 dagar efter behandling.	Villkoret är till för att skydda betesdjuren	