

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Steward 30 WG**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2</sup>	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring <sup>3</sup>
							Produkt	Verksamt ämne		
Raps och rybs	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	40-57	1 gång/år			85 g/ha	25,5 g indoxakarb/ha		
Äpple och päron	Mot insekts- angrepp	Fläktspruta		2 gångar/år	21	7	230 g/ha	70 g indoxakarb/ha	Totala maximala dosen får inte överstiga 340 g produkt/ha och säsong.	
Broccoli, blomkål, vitkål, rödkål och savoykål	Mot insekts- angrepp	Sprutning	Från 40	3 gångar/år	8	1	85 g/ha	25,5 g indoxakarb/ha	Totala maximala dosen får inte överstiga 255 g produkt/ha och säsong.	
Brysselkål	Mot insekts- angrepp	Sprutning	Från 40	3 gångar/år	8	28	85 g/ha	25,5 g indoxakarb/ha	Totala maximala dosen får inte överstiga 255 g produkt/ha och säsong.	
Gurka, zucchini, pumpa, tomat, paprika, chili, aubergin och melon i växthus	Mot insekts- angrepp	Sprutning		3 gångar/år	8	1	12,5 g/ha	3,75 g indoxakarb/ha	Maximalt 6 behandlingar per växthus och år får göras.	

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum  
2018-10-18Diariernr  
5.1.1-B18-00554Aktnr  
F-3431

Tillstånd och upplysning

Produktnamn  
Steward 30 WGReg nr  
5429

## Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3</sup>
Åtgärder för skydd av bin och andra pollinerande insekter.	Växtskyddsmedlet får inte spridas där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. Avlägsna eller täck över bikupor som är placerade i fältet tills sprutvätskan har torkat in. Om bikupor utanför fältet kan exponeras vid spridning ska ett vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälprea vid bestämning av anpassade skyddsavstånd".		
Åtgärder för skydd av pollinerande insekter i växthus	Ta bort humlekolonier och andra pollinerande insekter eller stäng till ingången till boet innan spridning av växtskyddsmedlet. Insekterna får återintroduceras i odlingen 3 dagar efter behandlingen.		
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling.	