

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **RATIO Super SX**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2</sup>	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring <sup>3</sup>
							Produkt	Verksamt ämne		
Vårvet, vårkorn och havre	Mot örtogräs	Bomspruta	11-39	1 gång/år			30g/ha	7,2 g /ha tribenuron <sup>4</sup> 7,2 g/ha tifensulfuron <sup>5</sup>	Användning får även ske i stråsäd med insädd av vall.	
Höstvet, höstkorn, höstråg och rågvete	Mot örtogräs	Bomspruta	20-39 Endast vår- behandling	1 gång/år			30g/ha	7,2 g /ha tribenuron <sup>4</sup> 7,2 g/ha tifensulfuron <sup>5</sup>	Användning får även ske i stråsäd med insädd av vall.	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3</sup>
Vindanpassade skyddsavstånd	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

<sup>4</sup> Dosen motsvarar 7,5 g/ha tribenuronmetyl

<sup>5</sup> Dosen motsvarar 7,5 g /ha tifensulfuronmetyl