

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Raptol Insekt Effekt Spray**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling			Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne		
Äpple, päron	Mot insekts- angrepp	Sprutning		2	Minst 7	3	150 mL/m ²	7,50 mg/m ² pyretiner 1238 mg/m ² rapsolja	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	X
Körsbär, plommon	Mot insekts- angrepp	Sprutning		2	Minst 7	3	122,5 mL/m ²	6,13 mg/m ² pyretiner 1011 mg/m ² rapsolja	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	X
Vinbär, krusbär, blåbär	Mot insekts- angrepp	Sprutning		2	Minst 7	3	100 mL/m ²	5 mg/m ² pyretriner 825 mg/m ² rapsolja	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	X
Frilandsodling av sallat, spenat, portlak, persilja, örter, morot, rödbeta, rotpersilja, palsternacka, rädisa, svartrot, cikoria, kålrot och pepparrot	Mot insekts- angrepp	Sprutning		2	5-7	3	60 mL/m ²	3 mg/m ² pyretriner 495 mg/m ² rapsolja	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	X
Växthusodling av sallat, spenat, portlak, persilja och örter	Mot insekts- angrepp	Sprutning		2	5-7	7	60 mL/m ²	3 mg/m ² pyretriner 495 mg/m ² rapsolja	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	X

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2018-10-30Diariernr
5.1.1-B17-00169Aktnr
F-4492

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Raptol Insekt Effekt SprayReg nr
5500

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling			Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne		
Tomat och aubergine	Mot insekts- angrepp	Sprutning		2	5-7	3	120 mL/m ²	6 mg/m ² pyretriner 990 mg/m ² rapsolja	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	X
Frilandsodling av prydnadsväxter	Mot insekts- angrepp	Sprutning	Växter under 50 cm	2	Minst 7		60 mL/m ²	3 mg/m ² pyretriner 495 mg/m ² rapsolja	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	X
Frilandsodling av prydnadsväxter	Mot insekts- angrepp	Sprutning	Växter över 50 cm	2	Minst 7		120 mL/m ²	6 mg/m ² pyretriner 990 mg/m ² rapsolja	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	X
Växthusodling av prydnadsväxter	Mot insekts- angrepp	Sprutning		4	Minst 7		120 mL/m ²	6 mg/m ² pyretriner 990 mg/m ² rapsolja	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	X

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Åtgärder för skydd av miljö	Den som sprider växtskyddsmedlet utomhus ska hålla följande minsta skyddsavstånd: - 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar, - 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	X
Åtgärder för skydd av bin och andra pollinerande insekter	Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.	Spridning av produkten bör göras nattetid.	X
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling.	X
Utformning av tunnelodling	Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.	Omfattar inte växthus.	X