

## Villkor för användning av **Tramat SC 500**

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetsprövningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

### Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1</sup> /säsong (min-max)	Max antal behandlings- omgångar	Minst antal dagar mellan varje behandli- ng (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2</sup>	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring <sup>3</sup>
							Produkt	Verksamt ämne		
Frilandsodling av rödbeta	Mot örtogräs	Bomspruta	10-18	1 per odlingssäsong			0,45 L/ha	225 g/ha Etofumesat	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.  Får ej användas i odlingar av baby-leaf.  Vid spridning av produkten ska 150-200 liter vatten per hektar användas.	

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

## BESLUTSBILAGA 3

Datum  
2018-11-28Diariernr  
5.1.1.-B18-00633Aktnr  
F-4473Produktnamn  
Tramat SC 500Reg nr  
5374

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1</sup> /säsong (min-max)	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandli ng (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2</sup>	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring <sup>3</sup>
							Produkt	Verksamt ämne		
Frilandsodling av rödbeta	Mot örtogräs	Bomspruta	10-18	2 per odlingssäsong	7		0,25 L/ha	125 g/ha Etofumesat	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.  Får ej användas i odlingar av baby-leaf.  Vid spridning av produkten ska 150-200 liter vatten per hektar användas.	
Frilandsodling av rödbeta	Mot örtogräs	Bomspruta	10-18	3 per odlingssäsong	7		0,14 L/ha	70 g/ha Etofumesat	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.  Får ej användas i odlingar av baby-leaf.  Vid spridning av produkten ska 150-200 liter vatten per hektar användas.	