

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Matrigrön 600 SL**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Sockerbetor, foderbetor och rödbetor	Mot örtogräs	Bomspruta	12-15	1 gång per år			200 mL/ha	120 g klopyralid ⁴ /ha		
Rödkål, vitkål, spetskål och savoykål	Mot örtogräs	Bomspruta	12-15	1 gång per år			200 mL/ha	120 g klopyralid ⁴ /ha		
Vete, korn, råg, rågvete och havre	Mot örtogräs	Bomspruta	21-32 Endast vår- behandling	1 gång per år			200 mL/ha	120 g klopyralid ⁴ /ha	Behandling får göras tidigast från 1 april.	
Majs	Mot örtogräs	Bomspruta	13-16	1 gång per år			200 mL/ha	120 g klopyralid ⁴ /ha	Gäller ej sockermajs.	
Lin	Mot örtogräs	Bomspruta	3-5 ⁵	1 gång per år			200 mL/ha	120 g klopyralid ⁴ /ha		
Skogsplanteskolor och skogsplanteringar på åkermark	Mot örtogräs	Handhållen spruta	Endast vår- behandling	1 gång per år			200 mL/ha	120 g klopyralid ⁴ /ha		
Slättervall och betesvall, gräsfrö till utsäde	Mot örtogräs	Bomspruta	21-37 Endast vår- behandling	1 gång per år		7	200 mL/ha	120 g klopyralid ⁴ /ha	Betesdjur får släppas på behandlad betesmark 7 dagar efter behandling.	

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

⁴ Dosen avser syraformen av klopyralid tillsatt som dess dimetylaminsalt i produkten.

⁵ Avser utvecklingsstadier för lin enligt Turner (1987).

Datum
2018-12-03Diariernr
5.1.1-B14-00099Aktnr
F-4166

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Matrigrön 600 SLReg nr
5507

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Vårraps och vårrybs	Mot örtogräs	Bomspruta	12-55	1 gång per år			200 mL/ha	120 g klopyralid ⁴ /ha		
Höstraps och höstrybs	Mot örtogräs	Bomspruta	31-55 Endast vår- behandling	1 gång per år			200 mL/ha	120 g klopyralid ⁴ /ha	Behandling får göras tidigast från 1 april.	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta.	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	