

Tillstånd och upplysning

## Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för **Legacy 500 SC**

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetstestningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

### Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsutrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2</sup>	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring <sup>3</sup>
							Produkt	Verksam ämne		
Frilandsodlingar av morötter, palsternacka och rotpersilja	Mot örtogräs	Bomspruta	Före uppkomst	1		90	150 ml/ha	75 g diflufenikan/ha	Vid spridning av produkten ska 200-300 liter vatten per hektar användas.	
Frilandsodlingar av plantskoleväxter	Mot örtogräs	Bomspruta med eller utan avskärmning	Före vegetering	1			150 ml/ha	75 g diflufenikan/ha	Vid spridning av produkten ska 200-300 liter vatten per hektar användas.	

### Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3</sup>
Anpassade skyddsavstånd vid spridning	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom."	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]