

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Legacy 500 SC**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete, höstkorn, råg, rågvete	Mot örtogräs	Bomspruta	Mindre än 31 Endast höst- behandling	1 per år			250 mL/ha	125 g/ha diflufenikan		
Höstvete, höstkorn, råg, rågvete	Mot örtogräs	Bomspruta	21-31 Endast vår- behandling	1 per år			200 mL/ha	100 g/ha diflufenikan	Om höstbehandling har skett får grödan inte behandlas på våren.	
Vårvete, vårkorn och havre	Mot örtogräs	Bomspruta	Mindre än 31	1 per år			150 mL/ha	75 g/ha diflufenikan		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Anpassade skyddsavstånd vid spridning	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]