

## Tillstånd och upplysning

### Villkor för användning av **Medax Max**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/område /situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2</sup>	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring <sup>3</sup>
							Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete och höstrågvete	För strå- förcortning	Bomspruta	29-49	2	7		0,75 kg/ha	37,5 g/ha prohexadion-kalcium 56,3 g/ha trinexapak (etylester)	Max dosen per odlingssäsong får inte översliga 1,0 kg produkt/ha.  Mellan BBCH 39-49 får max dosen inte uppgå till mer än 0,5 kg produkt/ha.	
Höstkorn och höstråg	För strå- förcortning	Bomspruta	29-49	2	7		1,0 kg/ha	50 g/ha prohexadion-kalcium 75 g/ha trinexapak (etylester)	Max dosen per odlingssäsong får inte översliga 1,0 kg produkt/ha.  Mellan BBCH 39-49 får max dosen inte översliga 0,75 kg produkt/ha.	
Hösthavre	För strå- förcortning	Bomspruta	29-39	1			0,75 kg/ha	37,5 g/ha prohexadion-kalcium 56,3 g/ha trinexapak (etylester)		

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

## BESLUTSBILAGA 3

Datum  
2019-04-04Diariernr  
5.1.1-B19-00178Aktnr  
F-4192Produktnamn  
Medax MaxReg nr  
5317

## Tillstånd och upplysning

Gröda/område /situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2</sup>	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring <sup>3</sup>
							Produkt	Verksamt ämne		
Vårkorn och vårvete	För strå- förlortning	Bomspruta	29-39	1			0,5 kg/ha	25 g/ha prohexadionkalcium 37,5 g/ha trinexapak (etylester)	För behandling i vårvete. mellan BBCH 35-39 får max dosen inte överstiga 0,3 kg produkt/ha	
Vårhavre	För strå- förlortning	Bomspruta	29-34	1			0,5 kg/ha	25 g/ha prohexadionkalcium 37,5 g/ha trinexapak (etylester)		
Rajgräsförl till utsäde	För strå- förlortning	Bomspruta	29-49	1			1 kg/ha	50 g/ha prohexadionkalcium 75 g/ha trinexapak (etylester)	Grödan får inte användas till foder. Totala maximala dosen per odlingssäsong får inte överstiga 1,0 kg produkt/ha.	
Gräsförl till utsäde	För strå- förlortning	Bomspruta	29-39	1			1 kg/ha	50 g/ha prohexadionkalcium 75 g/ha trinexapak (etylester)	Grödan får inte användas till foder.	

## Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3</sup>
Personlig skydds- utrustning	Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär kontakt med sprutvätskan eller sprutdimma.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	X