

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Gibb Plus**.

Dispens under perioden 2019-05-15 till 2019-06-30

Användning och syfte

| Gröda/område/situation | Syfte | Behandlings- utrustning/ metod | Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max) | Max antal behand- lingar | Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn) | Karens- tid (dygn) ² | Max dos vid varje behandling | | Övriga villkor och förtydliganden |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Produkt | Verksamt ämne | |
| Odlingar av äpple och päron | Tillväxt- reglering | Fläktspruta | Från BBCH 56 (tät klunga) till 6 veckor efter blomning (cell- delnings- fasen) | 4 | 10 | | 0,5 L/ha | 5 g gibberellin /ha | |

Ytterligare villkor

| Kategori | Villkor | Anmärkning |
|---------------------------------|--|---|
| Personlig skydds- utrustning | Vid hantering av produkten ska skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon användas. | Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. |

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd