

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Signum**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

| Gröda/område/situation | Syfte | Behandlings- utrustning/ metod | Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max) | Max antal behand- lingar | Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn) | Karens- tid (dygn) ²⁾ | Max dos vid varje behandling | | Övriga villkor och förttydliganden | Ändring ³⁾ |
|--|-----------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Produkt | Verksamt ämne | | |
| Plommon och körsbär | Mot svamp- angrepp | Fläktspruta | 60-81 | 3 per år | 7 | 3 | 750 g/ha | 200 g/ha Boskalid 50 g/ha Pyraklostrobin | | |
| Jordgubbar | Mot svamp- angrepp | Bandspruta | 60-81 | 2 per år | 10 | 3 | 1,8 kg/ha | 481 g/ha Boskalid 120 g/ha Pyraklostrobin | | |
| Potatis | Mot svamp- angrepp | Bomspruta | 47-75 | 4 per år | 5 | 3 | 250 g/ha | 67 g/ha Boskalid 17 g/ha Pyraklostrobin | | |
| Morot, palsternacka och persiljerot | Mot svamp- angrepp | Bomspruta | 41-49 | 2 per år | 10 | 14 | 1 kg/ha | 267 g/ha Boskalid 67 g/ha Pyraklostrobin | | |
| Kepalök | Mot svamp- angrepp | Bomspruta | 11-47 | 2 per år | 5 | 7 | 1 kg/ha | 267 g/ha Boskalid 67 g/ha Pyraklostrobin | | |
| Broccoli, blomkål, vitkål, rödkål, savojkål och brysselkål | Mot svamp- angrepp | Bomspruta | 41-49 | 3 per år | 14 | 14 | 1 kg/ha | 267 g/ha Boskalid 67 g/ha Pyraklostrobin | | |
| Sallat och ruccola | Mot svamp- angrepp | Bomspruta | Vid angrepp | 2 per år | 7 | 7 | 1,5 kg/ha | 400 g/ha Boskalid 100 g/ha Pyraklostrobin | | |
| Ärter/färska utan skida | Mot svamp- angrepp | Bomspruta | 60-69 | 1 per år | | 14 | 1 kg/ha | 267 g/ha Boskalid 67 g/ha Pyraklostrobin | | |
| Bönor och ärter/torkade | Mot svamp- angrepp | Bomspruta | 60-69 | 2 per år | 10 | 21 | 1 kg/ha | 267 g/ha Boskalid 67 g/ha Pyraklostrobin | | |

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2019-07-01Diariernr
5.1.1-B19-00180Aktnr
F-3552

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Signum

Produktkod

Reg nr
4884

Ytterligare villkor

| Kategori | Villkor | Anmärkning | Ändring ²⁾ |
|---|---|---|-----------------------|
| Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta | Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom." | Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer. | X |
| Vid spridning med fläktspruta i plommon och körsbär | Utrustning som reducerar avdriften med minst 25 % ska användas vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken. Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling." Vid användning av avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för 0 % avdriftsreduktion. | Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer. | X |
| Personlig skyddsutrustning | Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten eller sprutvätskan. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment under spridning som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma. | Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. | |