

Tillstånd och upplysning

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för **Signum**

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetstestningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens-tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Purjolök	Mot Stemphylium leaf blight (<i>Stemphylium sp</i>)	Bomspruta	Från BBCH 40	2 per år	7	14	1,5 kg /ha	400 g/ha Boskalid 100 g/ha Pyraklostrobin	Rekommenderad vattenmängd 300-500 L/ha.	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta och fläktspruta.	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]