

Villkor för användning av **Mainspring**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behandlings- gångar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Växthusodling av prydnadsväxter	Mot insektsangrepp	Sprutning		2 gånger per odlingskultur	7		25 mg/m ²	10 mg cyantraniliprol/m ²	Blommande växter får lämna växthuset tidigast 7 dagar efter behandling, för att skydda bin och andra pollinerande insekter.	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009. Omfattar inte tunnelodling.		

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

BESLUTSBILAGA 3

Datum
2019-08-20

Diariernr
5.1.1-B19-00313

Aktnr
F-4762

Produktnamn
Mainspring

Reg nr
5558

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.		
Vid återinträde i behandlade utrymmen	Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandling. Utrymmet ska vädras ordentligt före återinträde. Vid återinträde i det behandlade utrymmet efter 24 timmar ska skyddsutrustning i form av skyddshandskar användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda de som arbetar i behandlade utrymmen.	
Tillredning av sprutvätska	Vid bekämpning av <i>Frankliniella occidentalis</i> ska en sockerlösning tillsättas vid beredning av sprutvätska.	Villkoret är till för att produkten ska vara effektiv.	