

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Fibro**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksam ämne		
Potatis	Mot bladlöss	Bomspruta	10-89	8 per år	7		10 L	8 kg/ha paraffinolja		X
Äpple, päron, plommon och körsbär	Mot fruktträds- spinnkvalster (<i>Panonychus ulmi</i>)	Sprutning	53-57	1 per år			30 L	24 kg/ha paraffinolja		X
Päron	Mot päron- bladloppa (<i>Cacopsylla pyri</i>)	Sprutning	53-57	2 per år	2		30 L	24 kg/ha paraffinolja	Totala maximala dosen får inte överskrida 40 L produkt per ha och år	X

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2019-08-27Diariernr
5.1.1-B19-00408Aktnr
F-3966

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
FibroReg nr
5174

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Vid spridning med fläktspruta eller bomspruta med vertikal bom	Ett anpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling Utrustning som reducerar vindavdriften med minst 50 % ska användas vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken. Vid användning av avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för 0 % avdriftsreduktion.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer	X
Hantering av sprutvätska	Sprutvätskan ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och spridning.		X