

Tillstånd och upplysning

## Villkor för användning av **DFF SC 500**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>1</sup>	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring <sup>2</sup>
							Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete, höstkorn, råg, rågvete	Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 10-15	1			0,1 L/ha	50 g diflufenikan/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika rader får inte kombineras.	
Höstvete, höstkorn, råg, rågvete	Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 20-28 Endast vår- behandling	1			0,12 L/ha	60 g diflufenikan/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika rader får inte kombineras.	
Vårvete, vårkorn och havre	Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 11-28 Endast vår- behandling	1			0,1 L/ha	50 g diflufenikan/ha		

### Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>2</sup>
Anpassade skyddsavstånd	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	
Tillredning av sprutvätska	Produkten ska skakas före användning.	Villkoret är till för att produkten ska vara homogen vid tillredning av sprutvätska.	

<sup>1</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>2</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]