

Tillstånd och upplysning

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för **Steward 30 WG**

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetstestningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ¹	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ²
							Produkt	Verksamt ämne		
Frilandsodling av jordgubbar	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	Före blomning eller efter skörd	1 per år			170 g/ha	51 g indoxakarb/ha	Vid spridning av produkten ska 600-1000 liter vatten per hektar användas.	
Frilandsodling av hallon, björnbär, blåbär och vinbär	Mot insekts- angrepp	Sprutning		1 per år		7	170 g/ha	51 g indoxakarb/ha	Vid spridning av produkten ska 600-1000 liter vatten per hektar användas.	X
Körbsär och plommon	Mot insekts- angrepp	Fläktspruta	Före blomning eller BBCH 69- 72 (kronblads- släpp till början på kartbildning)	1 per år		7	230 g/ha	70 g indoxakarb/ha	Vid spridning av produkten ska 200-1350 liter vatten per hektar användas.	
Sockermajs	Mot majsmott (Ostrinia nubilalis)	Bomspruta	Efter BBCH 34	1 per år		7	125 g/ha	37,5 g indoxakarb/ha	Vid spridning av produkten ska 200-400 liter vatten per hektar användas.	X
Fodermajs och biogasmajs	Mot majsmott (Ostrinia nubilalis)	Bomspruta	Efter BBCH 34	1 per år		14	125 g/ha	37,5 g indoxakarb/ha	Vid spridning av produkten ska 200-400 liter vatten per hektar användas.	X

¹ Tid mellan sista behandling och skörd

² Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

BESLUTSBILAGA

Datum
2020-01-23

Diariernr
5.1.1-B20-00008

Aktnr
F-3431

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Steward 30 WG

Reg nr
5429

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Åtgärder för skydd av bin och andra pollinerande insekter.	Växtskyddsmedlet får inte spridas där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. Avlägsna eller täck över bikupor som är placerade i fältet tills sprutvätskan har torkat in. Om bikupor utanför fältet kan exponeras vid spridning ska ett anpassat skyddsavstånd till omgivande miljö bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd".		