

Tillstånd och upplysning

## Villkor för användning av Nexide CS

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium/säsong (min-max)	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens-tid (dygn) <sup>1</sup>	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring <sup>2</sup>
							Produkt	Verksamt ämne		
Vete, korn, havre, råg, rågvete	Mot insektsangrepp	Bomspruta	BBCH 12-75	1 per säsong		21	50 mL/ha	3 g gamma-cyhalotrin/ha		
Raps och rybs	Mot insektsangrepp	Bomspruta	BBCH 10-69	1 per säsong		28	60 mL/ha	3,6 g gamma-cyhalotrin/ha		
Ärter utan balja	Mot insektsangrepp	Bomspruta	BBCH 10-69	1 per säsong		14	60 mL/ha	3,6 g gamma-cyhalotrin/ha		

### Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>2</sup>
Spridningsutrustning	Utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % ska användas vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	
Anpassade skyddsavstånd vid spridning.	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Vid användning av avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och insekter utanför fältet.	
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda användare.	

<sup>1</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>2</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]