

Tillstånd och upplysning

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för **Boxer**

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetstestningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ¹	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ²
							Produkt	Verksamt ämne		
Frilandsodling av jordgubbar	Mot ogräs	Bomspruta	Efter skörd	2 per år	14		2,5 L/ha	2,0 kg/ha prosulfokarb	Totala maximala dosen får inte överstiga 5 L produkt/ha och år. Vid spridning av produkten ska 200-300 L vatten per hektar användas.	
Planteringsåret för frilandsodlade jordgubbar	Mot ogräs	Bomspruta	Tidigast 2 veckor efter plantering fram till mitten av oktober.	2 per år	14		2,5 L/ha	2,0 kg/ha prosulfokarb	Skörden under planteringsåret får inte användas till konsumtion. Totala maximala dosen får inte överstiga 5 L produkt/ha och år. Vid spridning av produkten ska 200-300 L vatten per hektar användas.	
Frilandsodling av sparris	Mot ogräs	Bomspruta	Efter skörd	1 per år			3,2 L/ha	2,6 kg/ha prosulfokarb	Vid spridning av produkten ska 200-300 L vatten per hektar användas.	
Frilandsodling av bruna bönor	Mot ogräs	Bomspruta	Före uppkomst	1 per år			3 L/ha	2,4 kg/ha prosulfokarb	Vid spridning av produkten ska 200-300 L vatten per hektar användas.	
Frilandsodling av kepalök och knipplök (av kepalök och salladslök)	Mot ogräs	Bomspruta	Behandling före uppkomst och/eller BBCH 11-13	4 per år	5	60	2 L/ha	1,6 kg/ha prosulfokarb	Totala maximala dosen får inte överstiga 4 L produkt/ha och år. Vid spridning av produkten ska 200-300 L vatten per hektar användas.	

¹ Tid mellan sista behandling och skörd

² Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2020-04-16Diariernr
5.1.1-B19-00756Aktnr
F-980Produktnamn
BoxerReg nr
5565

Tillstånd och upplysning

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ¹	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ²
							Produkt	Verksamt ämne		
Frilandsodling av vitlök	Mot ogräs	Bomspruta	Behandling före uppkomst och/eller BBCH 11-13	4 per år	5	70	2 L/ha	1,6 kg/ha prosulfokarb	Totala maximala dosen får inte överstiga 4 L produkt/ha och år. Vid spridning av produkten ska 200-300 L vatten per hektar användas.	
Frilandsodling av purjolök	Mot ogräs	Bomspruta	Före uppkomst eller plantering och/eller BBCH 11-13	4 per år	5	80	2 L/ha	1,6 kg/ha prosulfokarb	Totala maximala dosen får inte överstiga 4 L produkt/ha och år. Vid spridning av produkten ska 200-300 L vatten per hektar användas.	
Frilandsodling av morot, palsternacka och rotpersilja	Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 11-14	2 per år	5	80	2 L/ha	1,6 kg/ha prosulfokarb	Totala maximala dosen får inte överstiga 4 L produkt/ha och år. Vid spridning av produkten ska 200-300 L vatten per hektar användas.	
Frilandsodling av rotselleri	Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 11-14	2 per år	5	80	2 L/ha	1,6 kg/ha prosulfokarb	Totala maximala dosen får inte överstiga 4 L produkt/ha och år. Vid spridning av produkten ska 200-300 L vatten per hektar användas.	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ²
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment med risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda användare	

Datum
2020-04-16Diariernr
5.1.1-B19-00756Aktnr
F-980

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
BoxerReg nr
5565

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ²
Vid spridning på hösten	<p>Det fordon som används vid spridning av växtskyddsmedlet ska ha tät förarhytt med ventilation. Ventilationen ska ha partikelfilter och kolfilter.</p> <p>Produkten får inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.</p> <p>Spridning ska göras mellan klockan 18 och klockan 03.</p> <p>Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning.</p> <p>Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.</p> <p>Avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften minst 75 % ska användas.</p> <p>Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavstånden i hjälpredan ska alltid avläsas i kolumnen för grov duschkvalitet.</p>	Villkoret är till för att skydda användare, kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och vattenlevande organismer.	
Vid spridning på våren	<p>Det fordon som används vid spridning av växtskyddsmedlet ska ha tät förarhytt med ventilation. Ventilationen ska ha partikelfilter och kolfilter.</p> <p>Avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften minst 75 % ska användas.</p> <p>Ett vندانpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavstånden i hjälpredan ska alltid avläsas i kolumnen för grov duschkvalitet.</p>	Villkoret är till för att skydda användare och vattenlevande organismer.	