

Bekämpningsmedel och biotekniska produkter

-Bilaga 3 – Specificerade användningsvillkor för **Vertimec**

Sammanfattning av användningsområdet

Mot skadeinsekter och spinn i odlingar av paprika, gurkväxter, sallat, örtekryddor, prydnadsväxter, jordgubbar och tomat.

Specifikation

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsmetod	Utvecklingsstadium ¹⁾ / säsong (min-max)	Max antal behandlingar/år	Behandlingsintervall (dygn)	Karens-tid ²⁾	Dos/ha vid varje behandling (min-max)		Anmärkning	Ändring ³⁾
							Kg eller liter produkt/ha	g verksamt ämne/ha		
Paprika, i växthus	Mot skadeinsekter och spinn	Heltäckande bladsprutning	Stadie 12-89/enda st under mars-oktober.	5	7	3	1,2 l	21,6 g		X
Gurka och squash, i växthus	Mot skadeinsekter och spinn	Heltäckande bladsprutning	Stadie 10-89/enda st under mars-oktober.	4	7	3	1,2 l	21,6 g		X
Melon och pumpa, i växthus	Mot skadeinsekter och spinn	Heltäckande bladsprutning	Stadie 10-89/enda st under mars-oktober.	3	7	3	1,2 l	21,6 g		X

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd (dygn)

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2013-03-11Diarienumr
F-2423-B11-00140Produktnamn
VertimecProduktkod
A8612AB/A8612AIReg nr
4693

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsmetod	Utvecklingsstadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behandlingar/år	Behandlingsintervall (dygn)	Karens-tid ²⁾	Dos/ha vid varje behandling (min-max)		Anmärkning	Ändring ³⁾
							Kg eller liter produkt/ha	g verksamt ämne/ha		
Sallat och örtekryddor, i växthus	Mot skadeinsekter och spinn	Heltäckande bladsprutning	Stadie 12-55/enda under mars-oktober.	4	7	12	0,5 l	9 g		X
Snittblommor, i växthus	Mot skadeinsekter och spinn	Heltäckande bladsprutning		3	7		1,2 l	21,6 g		X
Prydnadsväxter (ej snittblommor), i växthus	Mot skadeinsekter och spinn	Heltäckande bladsprutning		5	5		1,2 l	21,6 g		X
Jordgubbar, i växthus	Mot skadeinsekter och spinn	Heltäckande bladsprutning	Stadie 12-89/enda under mars-oktober.	3	7	3	1,2 l	21,6 g		X
Tomat, i växthus	Mot skadeinsekter och spinn	Heltäckande bladsprutning	Stadie 12-89/enda under mars-oktober.	5	7	3	1,2 l	21,6 g		X

Övriga villkor för användning

Gröda/område/situation	Övriga villkor	Ändring ³⁾
All användning	Vid behandling i växthus ska utplacerade kolonier av humlor eller andra pollinerande insekter stängas till eller tas bort ur odlingen innan sprutning och får återintroduceras tidigast 4 dagar efter behandlingen.	X