

Bekämpningsmedel och biotekniska produkter

Bilaga 3 – Specificerade användningsvillkor för **Belvedere (AGAN SE 39)**

Sammanfattning av användningsområdet

Mot örtogräs i odlingar av sockerbetor och foderbetor.

Specifikation

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsmetod	Utvecklingsstadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behandlingar/år	Behandlingsintervall (dygn)	Karens-tid ²	Dos/ha vid varje behandling (min-max)		Anmärkning	Ändring ³⁾
							Kg eller liter produkt/ha	g verksamt ämne/ha		
sockerbetor och foderbetor	Örtogräs	Lantbruksspruta med bom	10 - 18	3	8		0,60 l	Desmedifam 64-96 g Fenmedifam 64-96 g		
sockerbetor och foderbetor	Örtogräs	Lantbruksspruta med bom	10 - 18	4	8		0,45 l	Desmedifam 64-72 g Fenmedifam 64-72 g		

Övriga villkor för användning

Gröda/område/situation	Övriga villkor	Ändring ³⁾
Vid spridning	För att begränsa riskerna för omgivande miljö ska vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom". De anvisningar som gäller bestämning av skyddsavstånd i Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 (kommentarer till 5-6§§ i SNFS 97:2) ska iakttas.	
Vid spridning	En markanpassad skyddszon om minst 10 m mot vatten ska hållas. Skyddszonen ska vara permanent bevuxen och vara anlagd 1 år före behandlingen. Skyddszonen ska bestå av gräs eller gräs i blandning med örtväxter. Den markanpassade skyddszonen ska räknas från strandlinjen för högvattenytan eller strandbrinkens överkant och ska hållas gentemot de vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.	

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd (dygn)

³⁾ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]