

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Cabrio Duo**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ¹	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ²
							Produkt	Verksamt ämne		
Gurkväxter med ätligt skal (slanggurka, druvgurka, squash och zucchini) på friland	Mot bladmögel	Bomspruta	BBCH 11-89	3 per år	7	1	2,5 L/ha	100 g/ha pyraklostrobin 180 g/ha dimetomorf		
Sallat uvudsallat, bladsallat, isbergssallad, bindsallat och romansallat) på friland	Mot bladmögel	Bomspruta	BBCH 10-49	3 per år	7	7	2,5 L/ha	100 g/ha pyraklostrobin 180 g/ha dimetomorf		
Kepalök, vitlök och schalottenlök på friland	Mot bladmögel	Bomspruta	BBCH 13-48	3 per år	7	7	2,5 L/ha	100 g/ha pyraklostrobin 180 g/ha dimetomorf		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ²
Personlig skydds- utrustning	Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda användare.	X
Anpassade skyddsavstånd vid spridning	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbrukspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och insekter utanför fältet.	

¹ Tid mellan sista behandling och skörd

² Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]