

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Medax Max**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utveckling sstadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete och höstrågvete	Fält	För strå- förförkortning	Bomspruta	BBCH 29–49	2 per år	7 dagar		0,75 kg/ha	37,5 g prohexadionkalcium/ha 56,3 g trinexapak (etylester)/ha	Max dosen per odlingssäsong får inte överstiga 1,0 kg produkt/ha. Mellan BBCH 39–49 får max dosen inte uppgå till mer än 0,5 kg produkt/ha.	
Höstkorn och höstråg	Fält	För strå- förförkortning	Bomspruta	BBCH 29–49	2 per år	7 dagar		1,0 kg/ha	50 g prohexadionkalcium/ha 75 g trinexapak (etylester)/ha	Max dosen per odlingssäsong får inte överstiga 1,0 kg produkt/ha. Mellan BBCH 39–49 får max dosen inte överstiga 0,75 kg produkt/ha.	
Hösthavre	Fält	För strå- förförkortning	Bomspruta	BBCH 29–39	1 per år			0,75 kg/ha	37,5 g prohexadionkalcium/ha 56,3 g trinexapak (etylester)/ha		

Datum
2020-08-12Diariernr
5.1.1-B18-00719Aktnr
F-4192

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Medax MaxReg nr
5317

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utveckling sstadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Vårkorn och vårvede	Fält	För strå- förkortning	Bomspruta	BBCH 29–39	2 per år	7 dagar		0,5 kg/ha	25 g prohexadionkalcium/ha 37,5 g trinexapak (etylester)/ha	Totala maximala dosen per odlingssäsong får inte överstiga 0,5 kg produkt/ha. För behandling i vårvede. Mellan BBCH 35–39 får max dosen inte överstiga 0,3 kg produkt/ha.	X
Vårhavre	Fält	För strå- förkortning	Bomspruta	BBCH 29–34	1 per år			0,5 kg/ha	25 g prohexadionkalcium/ha 37,5 g trinexapak (etylester)/ha		
Rajgräsfrö till utsäde	Fält	För strå- förkortning	Bomspruta	BBCH 29–49	1 per år			1 kg/ha	50 g prohexadionkalcium/ha 75 g trinexapak (etylester)/ha	Grödan får inte användas till foder. Totala maximala dosen per odlingssäsong får inte överstiga 1,0 kg produkt/ha.	
Gräsfrö till utsäde	Fält	För strå- förkortning	Bomspruta	BBCH 29–39	1 per år			1 kg/ha	50 g prohexadionkalcium/ha 75 g trinexapak (etylester)/ha	Grödan får inte användas till foder.	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skydds- utrustning	Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda användaren mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	X