

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Vertimec**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium/säsong (min-max)	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens-tid (dygn) <sup>1</sup>	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring <sup>2</sup>
							Produkt	Verksamt ämne		
Paprika och tomat i växthus	Mot insekts- och kvalsterangrepp	Sprutning	BBCH 12-89	5 per år	7	3	0,12 mL/m <sup>2</sup>	2,16 mg abamectin/m <sup>1</sup>	Produkten får bara användas från mars till oktober.	X
Gurka och squash i växthus	Mot insekts- och kvalsterangrepp	Sprutning	BBCH 10-89	4 per år	7	3	0,12 mL/m <sup>2</sup>	2,16 mg abamectin /m <sup>2</sup>	Produkten får bara användas från mars till oktober.	X
Melon och pumpa i växthus	Mot insekts- och kvalsterangrepp	Sprutning	BBCH 10-89	3 per år	7	3	0,12 mL/m <sup>2</sup>	2,16 mg abamectin /m <sup>2</sup>	Produkten får bara användas från mars till oktober.	X
Sallat och örtekryddor i växthus	Mot insekts- och kvalsterangrepp	Sprutning	BBCH 12-55	4 per år	7	12	0,05 mL/m <sup>2</sup>	0,9 mg abamectin /m <sup>2</sup>	Produkten får bara användas från mars till oktober.	X
Jordgubbar i växthus	Mot insekts- och kvalsterangrepp	Sprutning	BBCH 12-89	3 per år	7	3	0,12 mL/m <sup>2</sup>	2,16 mg abamectin /m <sup>2</sup>	Produkten får bara användas från mars till oktober.	X
Snittblommor i växthus	Mot insekts- och kvalsterangrepp	Sprutning		3 per år	7		0,12 mL/m <sup>2</sup>	2,16 mg abamectin /m <sup>2</sup>		X
Prydnadsväxter i växthus	Mot insekts- och kvalsterangrepp	Sprutning		5 per år	5		0,12 mL/m <sup>2</sup>	2,16 mg abamectin /m <sup>2</sup>	Gäller inte snittblommor.	X

<sup>1</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>2</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum  
2020-04-01Diariernr  
5.1.1-B20-00218Aktnr  
F-2423

Tillstånd och upplysning

Produktnamn  
VertimecReg nr  
4693

## Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3</sup>
Åtgärder för skydd av pollinerande insekter i växthus	Ta bort humlekolonier och andra pollinerande insekter eller stäng till ingången till boet innan spridning av växtskyddsmedlet. Insekterna får återintroduceras i odlingen 3 dagar efter behandlingen.		
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätskan eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda användare.	
Vid återinträde i behandlade utrymmen	Lokalerna ska vädras omsorgsfullt efter behandling. Återinträde i lokaler där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandlingen. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda arbetare.	
Hantering av sprutvätska	Sprutvätskan ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och spridning.		
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling.	