

Tillstånd och upplysning

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för **Signum**

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytoxicitetstestprövningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling		Anmärkning	Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne		
Rödbetor på friland	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	36-49	2	14	14	1000 g/ha	267 g/ha boskalid 67 g/ha pyraklo- strobilin	Vattenmängd vid spädning i tank: 200-400 l/ha	X
Späda bladgrödor (Baby- leaf) på friland	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	11-18	2	7-14	7	1500 g/ha	400,5 g/ha boskalid 100,5 g/ha pyraklo- strobilin	Avser unga blad och skaft från alla grödor (inklusive <i>Brassica</i> - arter) som skördas upp till åttabladdstadiet. Vattenmängd vid spädning i tank: 300-500 l/ha	X

Ytterligare villkor

Gröda/område/situation	Ytterligare villkor	Anmärkning	Ändring ⁴⁾
Åtgärder för skydd av miljö vid spridning	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom". De anvisningar som gäller bestämning av skyddsavstånd i Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 (kommentarer till 5-6§§ i SNFS 97:2) ska iakttas.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	X
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar och skyddskläder användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	X

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]