

## Villkor för användning av **Steward 30 WG**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Raps och rybs		Mot insekts- angrepp	Bomspruta	BBCH 40-57	1 per år			85 g/ha	25,5 g indoxakarb/ha		X
Äpple och päron		Mot insekts- angrepp	Fläktspruta		2 per år	21	7	230 g/ha	70 g indoxakarb/ha	Totala maximala dosen får inte överstiga 340 g produkt/ha och säsong	
Broccoli, blomkål, vitkål, rödkål och savoykål		Mot insekts- angrepp	Sprutning	Från BBCH 40	3 per år	8	1	85 g/ha	25,5 g indoxakarb/ha	Totala maximala dosen får inte överstiga 255 g produkt/ha och säsong.	
Brysselkål		Mot insekts- angrepp	Sprutning	Från BBCH 40	3 per år	8	28	85 g/ha	25,5 g indoxakarb/ha	Totala maximala dosen får inte överstiga 255 g produkt/ha och säsong	
Gurka, zucchini, pumpa, tomat, paprika, chili, aubergin och melon	Växthus	Mot insekts- angrepp	Sprutning		3 per kultur	8	1	12,5 g/ha	3,75 g indoxakarb/ha	Maximalt 6 behandlingar per växthus och år får göras.	X

Datum  
2020-10-23Diariernr  
5.1.1-B20-00487Aktnr  
F-3431Produktnamn  
Steward 30 WGReg nr  
5429

## Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Åtgärder för skydd av bin och andra pollinerande insekter	Växtskyddsmedlet får inte spridas där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. Avlägsna eller täck över bikupor som är placerade i fältet tills sprutvätskan har torkat in. Om bikupor utanför fältet kan exponeras vid spridning ska ett vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälprea vid bestämning av anpassade skyddsavstånd".		
Åtgärder för skydd av pollinerande insekter i växthus	Ta bort humlekolonier och andra pollinerande insekter eller stäng till ingången till boet innan spridning av växtskyddsmedlet. Insekterna får återintroduceras i odlingen 3 dagar efter behandlingen.		
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling.	