

Användningsområde för växtskyddsmedlet Boxer, reg nr 3887.

Er ansökan 2011-01-18.

Beslut

Kemikalieinspektionens bifaller ansökan från Gröna näringens riksorganisation (GRO) om att utvidga användningsområdet för Boxer, innehållande prosulfokarb, till att även omfatta användning mot ogräs i odlingar av morötter, palsternacka, rotselleri, rotpersilja, bruna bönor och sparris.

Medgivandet gäller så länge Boxer, reg nr 3887, är godkänt och under följande villkor:

I odlingar av morötter och palsternacka

Max dos: 4 l Boxer/ha och säsong. 2 l Boxer/ha och behandling.

Karenstid: 80 dagar.

Behandlingstidpunkt: Endast efter uppkomst och senast när morötterna och palsternackorna har 4 örtblad (BBCH 14).

I odlingar av rotselleri

Max dos: 4 l Boxer/ha och säsong.

Karenstid: 80 dagar.

I odlingar av rotpersilja

Max dos: 4 l Boxer/ha och säsong.

Karenstid: 80 dagar.

I odlingar av sparris

Max dos: 4 l Boxer/ha och säsong.

Behandlingstidpunkt: Endast efter skörd.

I odlingar av bruna bönor

Max dos: 3 l Boxer/ha och säsong.

Antal behandlingar: 1 behandling före uppkomst.

Bakgrund

GRO hänvisar till pågående arbete med att utveckla en ogrässtrategi för att finna ersättare för i första hand Stomp SC. De anför följande.

Det saknas en produkt för användning mot nattskatta efter uppkomst. 2010 års försök är färdigutvärderat och de bifogar resultatet från dessa. Boxer används efter uppkomst i flera led och resultatet är mycket lovande, särskilt i kombination med Centium. I palsternacka används en strategi baserad på Fenix och Stomp SC. Då Stomp inte längre är godkänt finns enbart Fenix till förfogande vilket ger alldeles för dålig ogräseffekt. Fenix har inte heller någon effekt mot nattskatta. Boxer skulle vara ett värdefullt komplement till Fenix. Rotselleri och rotpersilja är båda mycket små grödor med stort behov av fler herbicider. Endast Fenix är idag tillåtet i dessa grödor. I sparrisodlingen är avsaknad av ogräsmedel ett stort problem. Inget preparat är idag registrerat för användning efter skörd. Sencor är godkänt för användning på våren innan skörd, men något preparat för användning efter skörd är nödvändigt för att rensa upp det ogräsbestånd som har uppkommit under sommaren. Sparris är en flerårig kultur där skörd tas flera år i rad. Skördetid är sen vår och tidig sommar. Skörd sker sällan efter midsommar. Året därefter växer nya skott upp som skördas. Det saknas resthaltsstudier för användning av Boxer i sparris. Behandling med Boxer sker på sensommaren efter skörd och nya skott skördas inte förrän under vår och försommar året efter, vilket innebär att grödan ligger i karens under hela hösten, vintern och våren mellan behandling och skörd. Baserat på det torde det inte vara nödvändigt med resthaltsstudier. I bruna bönor är behovet av en ny herbicid akut. Stomp SC har varit basen i ogräsbekämpningen då det använts före uppkomst. Som komplement om behov föreligger används Basagran efter uppkomst. Då Stomp SC inte längre får användas krävs att en ny herbicid registreras in för användning innan uppkomst. Under två års tid har herbicider prövats ut i bruna bönor. Boxer är ett preparat som har fungerat väl och uppvisar en god effekt och ringa skador.

GRO hänvisar till att Boxer är registrerat (off label) för användning i morötter i Danmark och i Storbritannien samt i palsternacka, rotselleri och pepparrot i Storbritannien. Till ansökan bifogas resthaltsstudier från frilandsförsök i norra regionen för morötter.

LRF/GRO hänvisar även till dokument som Syngenta Crop Protection A/S har sänt in till KemI som de menar styrker en användning i bruna bönor (färska ärter och bönor samt torkade kikärtor och linser) före uppkomst.

Motivering

Kemikalieinspektionen kan utvidga en produkts användningsområde på begäran av andra än innehavaren av godkännandet om den tänkta användningen inte medför några risker för människors och djurs hälsa och inte påverkar miljön på ett oacceptabelt sätt samt är av mindre omfattning.

Livsmedelsverket har 2011-04-26 yttrat sig i ärendet och sammanfattar sin bedömning av underlaget genom att konstatera att användningen av Boxer i morötter, palsternacka, rotselleri, rotpersilja, bruna bönor och sparris enligt angiven rekommendation inte bör ge upphov till resthalter över de idag gällande EG-gränsvärdena för prosulfokarb.


Boxer har tidigare bedömts som acceptabelt ur risksynpunkt för användning mot ogräs i höstsäd och potatis vid prövning av godkännande samt i jordgubbar, lök och i utsädesodling av ängsgröe vid prövning av utvidgat användningsområde. Kemikalieinspektionen gör bedömningen att den tilltänkta användningen är av mindre omfattning och behövs för att tillgodose allmänna intressen. Ansökan bör därför bifallas.


Beslutet grundas på 27 § förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel samt 3 kap. 4 § i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel.

Hur man överklagar

Detta beslut får överklagas hos miljödomstolen, Nacka tingsrätt. Ett skriftligt överklagande ställt till miljödomstolen ska i så fall ha inkommit till Kemikalieinspektionen, Box 2, 172 13 Sundbyberg, inom tre veckor från den dagen klaganden fick del av beslutet.

På Kemikalieinspektionens vägnar


Gunilla Ericson


Peter Bergkvist



Övriga närvarande: Catarina Svärd

Kopia till:

Syngenta Crop Protection A/S
att: Marie Grimstrup
Strandlodsvej 44
DK-2300 Köpenhamn S
Danmark