

Villkor för användning av **Fibro**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utveckling sstadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Potatis		Mot bladlöss	Bomspruta	BBCH 10-89	8 per år	7		10 L	8 kg paraffinolja/ha		X
Äpple, päron, plommon och körsbär		Mot fruktträds- spinnkvalster (<i>Panonychus ulmi</i>)	Sprutning	BBCH 53-57	1 per år			30 L	24 kg paraffinolja/ha		X
Päron		Mot päron- bladloppa (<i>Cacopsylla pyri</i>)	Sprutning	BBCH 53-57	2 per år	2		30 L	24 kg paraffinolja/ha	Totala maximala dosen får inte överskrida 40 L produkt per ha och år.	X

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med fläktspruta eller bomspruta med vertikal bom	Ett anpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling". Utrustning som reducerar vindavdriften med minst 50 % ska användas vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken. Vid användning av avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för 0 % avdriftsreduktion.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer	
Hantering av brukslösning	Brukslösningen ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och spridning.		X