

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för **Pictor Active**

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X
Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fitototoxicitetsprövningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Senap		Mot svamp- angrepp	Bomspruta	BBCH 51–69	2 per år	7		1 L/ha	150 g boskalid/ha 250 g pyraklostrobin/ha	Totala maximala dosen får inte överskrida 1,0 L produkt/ha och odlingssäsong. Rekommenderad vattenmängd vid spridning är 100 – 400 L/ha.	
Lin		Mot svamp- angrepp	Bomspruta	Turner (1987) 6–9	2 per år	7		1 L/ha	150 g boskalid /ha 250 g pyraklostrobin/ha	Totala maximala dosen får inte överskrida 1,0 L produkt/ha och odlingssäsong. Rekommenderad vattenmängd vid spridning är 100 – 400 L/ha.	
Vallmo		Mot svamp- angrepp	Bomspruta	BBCH 51–69	2 per år	7		1 L/ha	150 g boskalid/ha 250 g pyraklostrobin/ha	Totala maximala dosen får inte överskrida 1,0 L produkt/ha och odlingssäsong. Rekommenderad vattenmängd vid spridning är 100 – 400 L/ha.	

Datum
2020-11-18Diariernr
5.1.1-B20-00214Aktnr
F-4414Produktnamn
Pictor ActiveReg nr
5405

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Oljerättika		Mot svamp- angrepp	Bomspruta	BBCH 51–69	2 per år	7		1 L/ha	150 g boskalid/ha 250 g pyraklostrobin/ha	Totala maximala dosen får inte överskrida 1,0 L produkt/ha och odlingssäsong. Rekommenderad vattenmängd vid spridning är 100 – 400 L/ha.	
Safflor/ färgtistel		Mot svamp- angrepp	Bomspruta	BBCH 51–69	2 per år	7		1 L/ha	150 g boskalid/ha 250 g pyraklostrobin/ha	Totala maximala dosen får inte överskrida 1,0 L produkt/ha och odlingssäsong. Rekommenderad vattenmängd vid spridning är 100 – 400 L/ha.	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skydds- utrustning	Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Vid återinträde i behandlade områden	Skyddshandskar ska användas vid arbete med behandlade växtdelar under de första 24 timmar efter behandling. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	X
Anpassade skyddsavstånd vid spridning	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	