

## Villkor för användning av **Legacy 500 SC**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete, höstkorn, råg, rågvete		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH mindre än 31 Endast höst- behandling	1 per år			250 mL/ha	125 g diflufenikan /ha		
Höstvete, höstkorn, råg, rågvete		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 21-31 Endast vår- behandling	1 per år			200 mL/ha	100 g diflufenikan /ha	Om höst- behandling har skett får grödan inte behandlas på våren.	
Vårvete, vårkorn och havre		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH mindre än 31	1 per år			150 mL/ha	75 g diflufenikan /ha		

### Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Anpassade skyddsavstånd vid spridning	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpredda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	