

Villkor för användning av **Flurostar 200**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete och höstkorn		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 20-45 Endast vårbehand- ling	1 per år			1 L/ha	200 g fluroxipyr/ha		X
Råg, rågvete, hösthavre och durumvete		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 20-45 Endast vårbehand- ling	1 per år			1 L/ha	200 g fluroxipyr/ha		X
Vårvete och vårkorn		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 20-39	1 per år			0,75 L/ha	150 g fluroxipyr/ha		X
Havre		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 20-31	1 per år			0,75 L/ha	150 g fluroxipyr/ha		X
Fodermajs		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 13-16	1 per år			1 L/ha	200 g fluroxipyr/ha		X
Nyetablerad odling av gräsfrö till utsäde, slåttervall och betesvall		Mot örtogräs	Bomspruta	t.o.m. juli	1 per år			0,75 L/ha	150 g fluroxipyr/ha		X

Datum
2021-10-25Diariernr
5.1.1-B21-00464Aktnr
F-3419Produktnamn
Flurostar 200Reg nr
5019

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Etablerad odling av gräsfrö till utsäde, slåttervall och betesvall		Mot örtogräs	Bomspruta	t.o.m. juli	1 per år			2 L/ha	400 g fluroxipyr/ha		X

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	X
Gräsfrö till utsäde, slåttervall och betesvall	Betesdjur får släppas på behandlad betesmark tidigast 7 dagar efter behandling.	Villkoret är till för att skydda betesdjuren.	X