

Sammanfattning av produkttegenskaper för en biocidprodukt

Produktnamn: IMIDASECT

Produkttyp(er): PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur

PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur

PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur

PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur

Godkännandenummer: 5354

**Referensnummer för post i
registret för biocidprodukter
(R4BP 3):** SE-0017742-0000

Innehållsförteckning

Administrativa uppgifter	1
1.1. Produktens handelsnamn	1
1.2. Innehavare av produktgodkännande	1
1.3. Tillverkare av biocidprodukter	1
1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet	1
2. Produktens sammansättning och formulering	2
2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten	2
2.2. Typ av formulering	2
3. Faro- och skyddsangivelser	2
4. Godkänd användning	3
5. Allmänna villkor för användning	8
5.1. Bruksanvisning	8
5.2. Riskbegränsande åtgärder	9
5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön	9
5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning	9
5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden	9
6. Övrig information	9

Administrativa uppgifter

1.1. Produktens handelsnamn

IMIDASECT

1.2. Innehavare av produktgodkännande

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet

Namn	Sharda Europe B.V.B.A
Adress	Heedstraat 58 1730 Asse Belgien
Godkännandenummer	5354
Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3)	SE-0017742-0000
Datum för godkännande	04/09/2017
Utgångsdatum för godkännande	14/12/2026

1.3. Tillverkare av biocidprodukter

Tillverkarens namn

Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd

Tillverkarens adress

Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Indien
--

Tillverkningsställe(n)

Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Indien
--

DTS OABE S.L., Polígono Industrial Zabale, Parcela 3 48410 Orozco (Vizcaya) Spanien

1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne	37 - Imidaklopid
Tillverkarens namn	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
Tillverkarens adress	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Indien
Tillverkningsställe(n)	HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO.LTD - 393 East Heping Road - Shijizhang Kina

2. Produktens sammansättning och formulering

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Imidaklopid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Verksamt ämne	138261-41-3	428-040-8	2,194

2.2. Typ av formulering

GD - Gel för direkt applicering

3. Faro- och skyddsangivelser

Faroangivelse	<p>Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.</p> <p>Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka allergisk reaktion.</p>
Skyddsangivelse	<p>Undvik utsläpp till miljön.</p> <p>Samla upp spill.</p> <p>Innehållet lämnas till en godkänd avfallsmottagare.</p> <p>behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare.</p>

4. Godkänd användning

4.1 Bruksanvisning

Användning 1 - Användning # 1 – inomhus, applicering i sprickor och springor, tysk kackerlacka, professionella

Produkttyp	PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Insekticid
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Blattella germanica Svenskt namn: Tysk kackerlacka Utvecklingsstadium: nymfer, vuxna
Användningsområde	Inomhus Inomhus Användning inomhus
Appliceringsmetod	Metod: Applicering i sprickor och springor Detaljerad beskrivning: Applicering i sprickor och springor
Appliceringshastighet och frekvens	Dosering: Litet/begränsat angrepp 0,1g/m ² ; stort/omfattandeangrepp 0,2g/m ² ; 1 droppe på 0,1 g motsvarar 5 mm i diameter. Spädning (%): Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Maximalt antal appliceringar: 6 per år.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Doseringsspruta (HDPE), 30g; 35g, 50g, 100g

4.1.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

- 1) Produkten får endast appliceras på begränsade områden på ytor som inte rengörs regelbundet, till exempel bakom eller under kylskåpet, under diskbänken, under ugnen eller varmvattenberedaren, i alla sprickor och springor som kan vara tillhåll för kackerlackor.
- 2) Utsätt inte betet för solljus eller värmekällor (tex element).
- 3) Applicera inte produkten på porösa ytor. Applicera i stället produkten på en plastfolie.

4.1.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning

4.1.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning

4.1.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning

4.1.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning

4.2 Bruksanvisning

Användning 2 - Användning # 2 – inomhus, applicering i sprickor och springor, orientalisk kackerlacka, professionella

Produkttyp

PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Insekticid

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Blatta orientalis
Svenskt namn: Orientalisk kackerlacka
Utvecklingsstadium: nymfer, vuxna

Användningsområde

Inomhus

Inomhus
Användning inomhus

Appliceringsmetod

Metod: Applicering i sprickor och springor
Detaljerad beskrivning:

-

Appliceringshastighet och frekvens

Dosering: Litet/begränsat angrepp 0,2g/m²; stort/omfattande angrepp 0,3g/m²; 1 droppe på 0,1 g motsvarar 5 mm diameter.
Spädning (%):
Antal appliceringar och tidpunkten för dessa:
Maximalt antal appliceringar: 6 per år.

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Doseringsspruta (HDPE), 30g; 35g, 50g, 100g

4.2.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

- 1) Produkten får endast appliceras på begränsade områden på ytor som inte rengörs regelbundet, till exempel bakom eller under kylskåpet, under diskbänken, under ugnen eller varmvattenberedaren, i alla sprickor och springor som kan vara tillhåll för kackerlackor.
- 2) Utsätt inte betet för solljus eller värmekällor (tex element).
- 3) Applicera inte produkten på porösa ytor. Applicera i stället produkten på en plastfolie.

4.2.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning

4.2.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning

4.2.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning

4.2.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning

4.3 Bruksanvisning

Användning 3 - Användning # 3 – inomhus, betesbrickor

Produkttyp	PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Insekticid
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Blattella germanica Svenskt namn: Tysk kackerlacka Utvecklingsstadium: nymfer, vuxna Vetenskapligt namn: Blatta orientalis Svenskt namn: Orientalisk kackerlacka Utvecklingsstadium: nymfer, vuxna
Användningsområde	Inomhus Inomhus Användning inomhus
Appliceringsmetod	Metod: På betesbrickor Detaljerad beskrivning: -
Appliceringshastighet och frekvens	Dosering: Litet/begränsat angrepp 0,2 g/m ² (en 0,75 g betesbricka per 4m ² , en 1g betesbricka per 5m ² , en 1,2g betesbricka per 6m ² , en 1,4g betesbricka per 7m ²). Stort/omfattande angrepp 0,3g/m ² (en 0,75 g betesbricka per 2,5m ² , en 1g betesbricka per 3m ² , en 1,2g betesbricka per 4m ² , en 1,4g betesbricka per 5m ²) Spädning (%): Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Maximalt antal appliceringar: 6 per år.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Betesbricka (HDPE), 0,75 g, 1 g, 1,2 g, 1,4 g

4.3.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Om ett stort antal kackerlackor observerats eller det misstänks att det finns många kackerlackor, hänvisas till appliceringsdosen för "stort/omfattande angrepp". Om endast ett fåtal eller enstaka kackerlackor observeras, hänvisas till appliceringsdosen för "litet/begränsat angrepp".

4.3.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

- 1) Betesbrickorna som används ska vara åverkanssäkra.
- 2) Öppna inte betesbrickan med våld.

4.3.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning

4.3.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning

4.3.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning

4.4 Bruksanvisning

Användning 4 - Användning # 4 – utomhus, betesbrickor

Produkttyp	PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Insekticid
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Blattella germanica Svenskt namn: Tysk kackerlacka Utvecklingsstadium: nymfer, vuxna Veterenskapligt namn: Blatta orientalis Svenskt namn: Orientalisk kackerlacka Utvecklingsstadium: nymfer, vuxna
Användningsområde	Utomhus Utomhus Användning utomhus som en barriär runt byggnader vid potentiella öppningar för kackerlackor
Appliceringsmetod	Metod: På betesbrickor Detaljerad beskrivning: -
Appliceringshastighet och frekvens	Dosering: Totalt 0,3 g/m omkrets (en 0,75 g betesbricka per 2,5 m, en 1 g betesbricka per 3 m, en 1,2 g betesbricka per 4 m, en 1,4 g betesbricka per 5 m) Spädning (%): Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Maximalt antal appliceringar: 6 per år.

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Betesbricka (HDPE), 0,75 g, 1 g, 1,2 g, 1,4 g

4.4.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Applicera endast betesbrickorna på hårda ytor som terrasser eller uteplats.

4.4.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

- 1) Betesbrickorna som används ska vara överkanssäkra.
- 2) Öppna inte betesbrickan med våld.
- 3) Applicera endast i områden som inte är benägna att bli våta, dvs skyddade från regn, översvämningar och rengöringsvatten.
- 4) Använd inte produkten där utsläpp till avlopp (kloak) inte kan förhindras.

4.4.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning

4.4.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning

4.4.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning

5. Allmänna villkor för användning**5.1. Bruksanvisning**

- 1) Följ bruksanvisningen.
- 2) Före behandling, ta bort alla naturliga födokällor för kackerlackor (avfall, matrester ...) från det angripna området för att stimulera intag av gelen.
- 3) Vid inspektioner, kontrollera det behandlade området och byt, om nödvändigt, ut gelen som används eftersom kackerlackor lämnar sekret och avföring för att locka till sig artfränder.
- 4) Produkten kan användas kontinuerligt i 3 månader utan att ersätta öppnade betesbrickor eller oanvända beten.
- 5) Informera tillståndshavaren om behandlingen är ineffektiv.
- 6) För att skydda fåglar, husdjur och andra icke målorganismer, måste döda kackerlackor tas bort från det behandlade området dagligen.
- 7) Kontrollera betesbrickorna en gång i veckan.
- 8) Undvik kontinuerlig användning av produkten.
- 9) I slutet av behandlingskampanjen, samla in betesbrickorna för kassering.

5.2. Riskbegränsande åtgärder

- 1) Förvaras utom räckhåll för barn.
- 2) Placera betet utom räckhåll för barn, fåglar, husdjur och andra djur som inte är mål för behandlingen.
- 3) Undvik utsläpp till miljön.
- 4) Använd inte direkt på eller nära mat, foder eller dryck, eller på ytor eller redskap som sannolikt kommer i direkt kontakt med mat, foder, drycker och djur.

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

- 1) Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktbehållare eller etikett till hands.
- 2) VID HUDKONTAKT: Ta av alla förorenade kläder och tvätta dem innan de används igen. Tvätta huden med vatten. Om hudirritation eller hudutslag uppstår: Sök läkare.
- 3) VID KONTAKT MED ÖGONEN: Om symtom uppstår, skölj med vatten. Ta bort eventuella kontaktlinser. Ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller en läkare.
- 4) VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare om symtom uppstår.
- 5) VID INANDNING: Ej tillämpligt.
- 6) Denna biocidprodukt innehåller imidakloprid som är farligt för bin.

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

- 1) Släpp inte ut oanvänd produkt på marken, i vattendrag, i rör (handfat, toaletter...) eller i avloppet.
- 2) Kassera oanvänd produkt, dess förpackning, betesbrickor och allt annat avfall (dvs döda insekter) i enlighet med lokala bestämmelser.
- 3) Rengör inte betesbrickorna före kassering.
- 4) Kassera innehåll/behållare enligt nationell lagstiftning.

5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

- 1) Förvara inte nära mat, dryck och djurfoder. Förvaras utom räckhåll för barn.
- 2) Hållbarhet 24 månader
- 3) Produkten måste förvaras mörkt.

6. Övrig information

Produkten innehåller ett bittermedel.