

Tillstånd och upplysning

## Villkor för användning av **Turex 50 WP**

### Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsmetod	Utvecklingsstadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behandlingar/år	Behandlingsintervall (dygn)	Karens-tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling (min-max)		Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
							Produkt	Verksamt ämne		
Köksväxter	Mot fjärilslarver	Sprutning		6			1000 g/ha	8,5·10 <sup>12</sup> CFU/ha		X
Frukt	Mot fjärilslarver	Sprutning		3			2000 g/ha	1,7·10 <sup>13</sup> CFU/ha		X
Bär	Mot fjärilslarver	Sprutning		3			2000 g/ha	1,7·10 <sup>13</sup> CFU/ha		X
Prydnadsväxter	Mot fjärilslarver	Sprutning		3			2000 g/ha	1,7·10 <sup>13</sup> CFU/ha		X
Fröproduktion av gran och tall	Mot fjärilslarver	Sprutning		3			2000 g/ha	1,7·10 <sup>13</sup> CFU/ha		X

### Ytterligare villkor

Gröda/område/situation	Ytterligare villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av växtskyddsmedlet eller sprutvätskan ska lämpliga skyddshandskar, skyddsglasögon/ansiktsskydd samt andningsskydd användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	X

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]