

Bruksanvisning för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för:

Mospilan SG, reg.nr 5708

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare beviljades den 31 mars 2022 UPMA-godkännande för att få använda insekticiden Mospilan SG, reg nr 5708, för att bekämpa klöverspetsvivelns vuxna individ och dess larv i fröodlingar av klöver (rödklöver, alsikeklöver samt vitklöver.

Denna bruksanvisning som gäller för UPMA ska läsas tillsammans med produktens ordinarie etikett och bruksanvisning. Där finns viktig information som också gäller vid användning enligt ett UPMA.

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

När en produkt används enligt ett UPMA ansvarar användaren själv för produktens effektivitet och för fytotoxiska skador som kan uppstå på grödan.

Användningsområde:

Mospilan SG ämnas att användas från sent knoppstadie till begynnande blomning, BBCH 55 - 63. Preparatet klassas som inte vara bifarligt, trots detta förordar vi en behandling på kvällen när pollinatörerna lämnat fältet. Mospilan SG verkar systemiskt vilket borgar för en god effekt på hela plantan samtidigt som ett visst långtidsskydd erhålles vilket ur odlarsynpunkt får betraktas som kritiskt. Vid behov finns det möjlighet att använda Mavrik vid en eventuell senare behandling. Att enbart använda Mavrik anses som ett betydligt sämre alternativ eftersom Mavrik saknar systemisk effekt.

Anvisningar om användning:

Tidpunkt för applicering av Mospilan SG
--

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare yrkar på dosering i klöver till fröproduktion med ett syfte att bekämpa klöverspetsvivel i en dosering av 0,2 kg/ha inom behandlingsintervallet Sent knoppstadie till begynnande blomning BBCH 55 – 63. Enbart 1 behandling/år vartannat år på det enskilda skiftet. Rekommenderad vätskemängd 200-600 liter/ha. För val av specifik appliceringsteknik hänvisas brukaren till etiketten för Mospilan SG samt ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom.” Skyddsavstånden ska alltid avläsas i kolumnen ”särskild hänsyn” i Hjälpredan

Gröda	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium / säsong (min- max)	Max antal behandling ar/år	Karens tid (dygn)	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förttydliga anden
						Produkt	Verksam ämne	
Rödklöver, alsikeklöver & vitklöver	Bekämpning av klöverspets vivel- dess vuxna individ samt dess larv	Bomspruta	Sent knoppstadium till begränsade blomning BBCH 55 - 63	1	Ej relevant	0,2 kg/ha	Acetamiprid 40 g/ha	200-600 liter vätskemängd /ha

För närmare information gällande verkningssätt, resistensrisk, optimala verkningsförhållanden, blandningar, beredning av sprutvätska, rengöring av sprututrustning, hantering av tomemballage samt förvaring av medel hänvisas till produktens etikett och bruksanvisning.

**För informationen i denna bilaga ansvarar
Sveriges Frö- & Oljeväxtodlare**