

## Villkor för användning av **Signum**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Plommon och körsbär		Mot svamp- angrepp	Fläktspruta	BBCH 60-81	3 per år	7	3	750 g/ha	200 g boskalid/ha 50 g pyraklostrobin/ha		
Jordgubbar		Mot svamp- angrepp	Bandspruta	BBCH 60-81	2 per år	10	3	1,8 kg/ha	481 g boskalid/ha 120 g pyraklostrobin/ha		
Potatis		Mot svamp- angrepp	Bomspruta	BBCH 47-75	4 per år	5	3	250 g/ha	67 g boskalid/ha 17 g pyraklostrobin/ha		
Morot, palsternacka och persiljerot		Mot svamp- angrepp	Bomspruta	BBCH 41-49	2 per år	10	14	1 kg/ha	267 g boskalid/ha 67 g pyraklostrobin/ha		
Kepalök		Mot svamp- angrepp	Bomspruta	BBCH 11-47	2 per år	5	7	1 kg/ha	267 g boskalid/ha 67 g pyraklostrobin/ha		
Broccoli, blomkål, vitkål, rödkål, savojkål och brysselkål		Mot svamp- angrepp	Bomspruta	BBCH 41-49	3 per år	14	14	1 kg/ha	267 g boskalid/ha 67 g pyraklostrobin/ha		
Sallat och ruccola		Mot svamp- angrepp	Bomspruta		2 per år	7	7	1,5 kg/ha	400 g boskalid/ha 100 g pyraklostrobin/ha		
Ärter/färska utan skida		Mot svamp- angrepp	Bomspruta	BBCH 60-69	1 per år		14	1 kg/ha	267 g boskalid/ha 67 g pyraklostrobin/ha		
Bönor och ärter/torkade		Mot svamp- angrepp	Bomspruta	BBCH 60-69	2 per år	10	21	1 kg/ha	267 g boskalid/ha 67 g pyraklostrobin/ha		

## Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer	
Vid spridning med fläktspruta i plommon och körsbär	<p>Utrustning som reducerar avdriften med minst 25 % ska användas vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken.</p> <p>Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling".</p> <p>Vid användning av avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för 0 % avdriftsreduktion.</p>	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer	
Personlig skyddsutrustning	<p>Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten eller brukslösningen.</p> <p>Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment under spridning som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.</p> <p>Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.</p>	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	