

Villkor för användning av **Focus Ultra**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

| Gröda/situation | Var /område | Syfte | Behandlings- utrustning/ metod | Utvecklings- stadium /tidpunkt | Max antal behand- lingar | Minst antal dagar mellan varje behandling | Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd | Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas | | Övriga villkor och förttydliganden | Ändring |
|--|-------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|-----------------------|---------------------------------------|---------|
| | | | | | | | | Produkt | Verksamt ämne | | |
| Höstraps | | Mot gräsogräs | Bomspruta | BBCH 13-32 | 1 per år | | | 2,0 L/ha | 0,2 kg cyklooxidim/ha | | |
| Rybs och vårraps | | Mot gräsogräs | Bomspruta | BBCH 12-32 | 1 per år | | | 5,0 L/ha | 0,5 kg cyklooxidim/ha | | |
| Sockerbetor, foderbetor, rödbetor | | Mot gräsogräs | Bomspruta | BBCH 12-39 | 1 per år | | | 5,0 L/ha | 0,5 kg cyklooxidim/ha | | |
| Potatis | | Mot gräsogräs | Bomspruta | BBCH 10-39 | 1 per år | | 56 | 5,0 L/ha | 0,5 kg cyklooxidim/ha | | |
| Ärter och bönor, torkade utan balja | | Mot gräsogräs | Bomspruta | BBCH 12-39 | 1 per år | | | 5,0 L/ha | 0,5 kg cyklooxidim/ha | | |
| Ärter, färska med och utan balja | | Mot gräsogräs | Bomspruta | BBCH 12-39 | 1 per år | | 35 | 5,0 L/ha | 0,5 kg cyklooxidim/ha | | |
| Bönor, färska med och utan balja | | Mot gräsogräs | Bomspruta | BBCH 12-39 | 1 per år | | 28 | 5,0 L/ha | 0,5 kg cyklooxidim/ha | | |
| Lusernfrö till utsäde | | Mot gräsogräs | Bomspruta | BBCH 11-51 | 1 per år | | | 5,0 L/ha | 0,5 kg cyklooxidim/ha | | |
| Klöverfrö till utsäde | | Mot gräsogräs | Bomspruta | BBCH 12-55 | 1 per år | | | 5,0 L/ha | 0,5 kg cyklooxidim/ha | | |
| Rödsvingelfrö och hårdsvingelfrö till utsäde | | Mot gräsogräs | Bomspruta | BBCH 14-34 | 1 per år | | | 5,0 L/ha | 0,5 kg cyklooxidim/ha | | |
| Linfrö | | Mot gräsogräs | Bomspruta | BBCH 12-39 | 1 per år | | | 5,0 L/ha | 0,5 kg cyklooxidim/ha | | |

Datum
2022-09-06Diariernr
5.1.1-B22-00498Aktnr
F-787Produktnamn
Focus UltraReg nr
5328

| Gröda/situation | Var /område | Syfte | Behandlings- utrustning/ metod | Utvecklings- stadium /tidpunkt | Max antal behand- lingar | Minst antal dagar mellan varje behandling | Karensid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd | Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas | | Övriga villkor och förttydliganden | Ändring |
|---|-------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|-----------------------|--|---------|
| | | | | | | | | Produkt | Verksamt ämne | | |
| Jordgubbar | Fält | Mot gräsogräs | Bomspruta | BBCH 11-16 | 1 per år | | 42 | 5,0 L/ha | 0,5 kg cykloxiidim/ha | | |
| Morötter | | Mot gräsogräs | Bomspruta | BBCH 12-45 | 1 per år | | 35 | 2,0 L/ha | 0,2 kg cykloxiidim/ha | | |
| Broccoli och blomkål | | Mot gräsogräs | Bomspruta | BBCH 13-35 | 1 per år | | 28 | 2,0 L/ha | 0,2 kg cykloxiidim/ha | | |
| Brysselkål | | Mot gräsogräs | Bomspruta | BBCH 13-35 | 1 per år | | | 2,0 L/ha | 0,2 kg cykloxiidim/ha | | |
| Vitkål | | Mot gräsogräs | Bomspruta | BBCH 12-45 | 1 per år | | 28 | 2,0 L/ha | 0,2 kg cykloxiidim/ha | | |
| Savojkål | | Mot gräsogräs | Bomspruta | BBCH 12-45 | 1 per år | | 21 | 2,0 L/ha | 0,2 kg cykloxiidim/ha | | |
| Grönkål, jerseykål, kinakål/salladskål, fodermärgskål | | Mot gräsogräs | Bomspruta | BBCH 13-35 | 1 per år | | 42 | 2,0 L/ha | 0,2 kg cykloxiidim/ha | | |
| Rovor för foderproduktion | | Mot gräsogräs | Bomspruta | BBCH 13-39 | 1 per år | | | 5,0 L/ha | 0,5 kg cykloxiidim/ha | | |
| Kålrot | | Mot gräsogräs | Bomspruta | BBCH 13-39 | 1 per år | | | 5,0 L/ha | 0,5 kg cykloxiidim/ha | | |
| Kepalök och schalottenlök | | Mot gräsogräs | Bomspruta | BBCH 15-45 | 1 per år | | 28 | 5,0 L/ha | 0,5 kg cykloxiidim/ha | | |
| Purjolök | | Mot gräsogräs | Bomspruta | BBCH 12-45 | 1 per år | | 42 | 5,0 L/ha | 0,5 kg cykloxiidim/ha | | |
| Majs | | Mot gräsogräs | Bomspruta | BBCH 12-19 | 1 per år | | 28 | 4,0 L/ha | 0,4 kg cykloxiidim/ha | Endast för cykloxiidimtoleranta varianter. | |
| Äpple och päron | | Mot gräsogräs | Bomspruta | April till juli | 1 per år | | 28 | 2,0 L/ha | 0,2 kg cykloxiidim/ha | Applivering får inte ske senare än juli. | |

Datum
2022-09-06Diariernr
5.1.1-B22-00498Aktnr
F-787Produktnamn
Focus UltraReg nr
5328

Ytterligare villkor

| Kategori | Villkor | Anmärkning | Ändring |
|---------------------------------------|---|---|---------|
| Anpassade skyddsavstånd vid spridning | Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälprea vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". | Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet. | |
| Personlig skyddsutrustning | Skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning. Vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. | Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker. | |
| Tillredning av brukslösning | För bekämpning av kvickrot med lägre dos än 4,0 L produkt/ha ska tillsatsmedlet DASH tillsättas vid beredning av brukslösning. | Villkoret är till för att produkten ska vara effektiv. | |