

Villkor för användning av **Cabrio Duo**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Gurkväxter med ätligt skal (slanggurka, druvgurka, squash och zucchini)	Fält	Mot bladmögel	Bomspruta	BBCH 11-89	3 per år	7	1	2,5 L/ha	100 g pyraklostrobin/ha 180 g dimetomorf/ha		
Sallat (huvudsallat, bladsallat, isbergssallad, bindsallat och romansallat)	Fält	Mot bladmögel	Bomspruta	BBCH 10-49	3 per år	7	7	2,5 L/ha	100 g pyraklostrobin/ha 180 g dimetomorf/ha		
Kepalök, vitlök och schalottenlök	Fält	Mot bladmögel	Bomspruta	BBCH 13-48	3 per år	7	7	2,5 L/ha	100 g pyraklostrobin/ha 180 g dimetomorf/ha		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skydds- utrustning	Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker	X
Anpassade skyddsavstånd vid spridning	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbrukspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och insekter utanför fältet.	