Villkor för användning av **Starane 333 HL**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/situation	Var/ område	Syfte	Behandlings-utrustning/ metod	Utvecklings-stadium /tidpunkt	Max antal behand-lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Änd-ring
								Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete, höstkorn, höstråg, höstrågvete		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 23–29	1 per år		60	0,25 L/ha	83 g fluroxipyr/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings-strategier får inte kombineras.	X
Höstvete, höstkorn, höstråg, höstrågvete		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 30–39	1 per år		60	0,36 L/ha	120 g fluroxipyr/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings-strategier får inte kombineras.	X
Höstvete, höstkorn, höstråg, höstrågvete		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 40–45	1 per år		60	0,4 L/ha	133 g fluroxipyr/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings-strategier får inte kombineras.	X
Vårvete, vårkorn, havre, vårråg		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 13–19	1 per år		60	0,1 L/ha	33 g fluroxipyr/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings-strategier får inte kombineras.	X
Vårvete, vårkorn, havre, vårråg		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 20–29	1 per år		60	0,25 L/ha	83 g fluroxipyr/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings-strategier får inte kombineras.	X

Mall-id: MAP-0033, 2018-05-17

Gröda/situation	Var/ område	Syfte	Behandlings-utrustning/ metod	Utvecklings-stadium /tidpunkt	Max antal behand-lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Änd-ring
								Produkt	Verksamt ämne		
Vårvete, vårkorn, havre, vårråg		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 30–45	1 per år		60	0,3 L/ha	100 g fluroxipyr/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings-strategier får inte kombineras.	X
Fodermajs		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 13–16	1 per år		90	0,15 L/ha	54 g fluroxipyr/ha		X

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Anpassade skyddsavstånd vid spridning	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbrukspruta med bom”.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och växter utanför fältet.	X
Personlig skydds-utrustning	Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	X