

## Villkor för användning av **Starane XL**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete, höstkorn, höstråg och höstrågvete		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 20–29 Endast vår- behandling	1 per år			1 L/ha	100 g fluroxipyr/ha 2,5 g florasulam/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Höstvete, höstkorn, råg och rågvete		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 30–45 Endast vår- behandling	1 per år			1,2 L/ha	120 g fluroxipyr/ha 3,0 g florasulam/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Vårvete, vårkorn och havre		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 13–19	1 per år			0,36 L/ha	36 g fluroxipyr/ha 0,9 g florasulam/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Vårvete, vårkorn och havre		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 20–29	1 per år			0,8 L/ha	80 g fluroxipyr/ha 2,0 g florasulam/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Vårvete, vårkorn och havre		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 30–45	1 per år			1,0 L/ha	100 g fluroxipyr/ha 2,5 g florasulam/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Nyetabletering av slättervall, betesvall och gräsfrö till utsäde		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 20–45 Endast vår- behandling	1 per år		7	1,5 L/ha	150 g fluroxipyr/ha 3,75 g florasulam/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X

Datum  
2022-10-25Diariernr  
5.1.1-B22-00467Aktnr  
F-2352Produktnamn  
Starane XLReg nr  
4686

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Etablerad slättervall, betesvall och gräsfrö till utsäde		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 20–45 Endast vår- behandling	1 per år		7	1,8 L/ha	180 g fluroxipyr/ha 4,5 g florasulam/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X

## Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Släpp av betesdjur	Betesdjur får släppas på behandlad betesmark tidigast 7 dagar efter behandling.		
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	